

Premedikasjonsveileder til barn
Retningslinje

Utarbeidet av:
Olav Søvik og Kirsti Menning

Godkjent av:
Avd.leder Grete K. Erdvik

Godkjent dato:
16.12.2020

Gjyldig til:
6.12.2023

Premedikasjon til barn > 5 kg < 50 kg

Barn under 5 kg/ 8 måneder: ikke premedikasjon med mindre dette er ordinert av anestesilege.

Premedikasjon gis 30 - 60 min før forventet anestesistart.

Kun barn som har behov for beroligende får midazolam eller dexdor (se egen prosedyre). For øvrig gis som hovedregel p

Vær oppmerksom på eventuelle kontraindikasjoner mot medikamentene, jfr. Felleskatalogen.

Midazolam mikstur 2 mg/ml per oralt:
0,3 mg/kg standard-dose.
(Variasjon 0,3 - 0,5 mg/kg). Maks dose 7,5 mg

eller

Midazolam injeksjonsvæske 5 mg/ml rectalt:
Ca. 0.4 mg/kg standard dose.
Maks dose 10 mg rectalt

Vekt	Dose i mg	Mengde i ml p. o.
5 kg	1,6 mg	0,8 ml mikstur
6 kg	2 mg	1 ml mikstur
7 kg	2,4 mg	1,2 ml mikstur
8 kg	2,4 mg	1,2 ml mikstur
9 kg	2,8 mg	1,4 ml mikstur
10 kg	3,2 mg	1,6 ml mikstur
11 kg	3,6 mg	1,8 ml mikstur
12 kg	3,6 mg	1,8 ml mikstur
13 kg	4 mg	2 ml mikstur
14 kg	4,4 mg	2,2 ml mikstur
15 kg	4,8 mg	2,4 ml mikstur
16 kg	4,8 mg	2,4 ml mikstur
17 kg	5,2 mg	2,6 ml mikstur
18 kg	5,6 mg	2,8 ml mikstur
19 kg	6 mg	3 ml mikstur
20 kg	6 mg	3 ml mikstur
21 kg	6,4 mg	3,2 ml mikstur
22 kg	6,8 mg	3,4 ml mikstur
23 kg	7,2 mg	3,6 ml mikstur
24 kg	7,2 mg	3,6 ml mikstur
25 kg	7,5 mg	7,5 mg tablett
Over 25 kg	7,5 mg	7,5 mg tablett

Vekt	Dose i mg	Mengde i ml rectalt
5 kg	2 mg	0,4 ml rectalt
6 kg	2,5 mg	0,5 ml rectalt
7 kg	3 mg	0,6 ml rectalt
8 kg	3 mg	0,6 ml rectalt
9 kg	3,5 mg	0,7 ml rectalt
10 kg	4 mg	0,8 ml rectalt
11 kg	4,5 mg	0,9 ml rectalt
12 kg	5 mg	1 ml rectalt
13 kg	5 mg	1 ml rectalt
14 kg	5,5 mg	1,1 ml rectalt
15 kg	6 mg	1,2 ml rectalt
16 kg	6,5 mg	1,3 ml rectalt
17 kg	7 mg	1,4 ml rectalt
18 kg	7 mg	1,4 ml rectalt
19 kg	7,5 mg	1,5 ml rectalt
20 kg	8 mg	1,6 ml rectalt
21 kg	8,5 mg	1,7 ml rectalt
22 kg	9 mg	1,8 ml rectalt
23 kg	9 mg	1,8 ml rectalt
24 kg	9,5 mg	1,9 ml rectalt
25 kg	10 mg	2 ml rectalt
Over 25 kg	10 mg	2 ml rectalt

Paracetamol gis helst per oralt, dette gir en raskere og mer forutsigbar effekt enn gitt rectalt.

Første dose paracetamol kan doseres inntil 40 mg/ kg per oralt eller rectalt.

Forutsetter at barnet ikke står på paracetamol fra før, at det ikke foreligger kontraindikasjoner.

De påfølgende dosene må justeres slik at maks døgndose ikke overskrides.

Maks døgndose paracetamol: Inntil 90 mg/kg/døgn de 3 første døgn, deretter inntil 60 mg/kg/døgn

Se forøvrig "[Smertebehandling av barn](#)"

Vekt	Paracetamol inntil 40 mg/kg	Ibuprofen (nurofen) 10 mg/kg
5 kg	185 mg supp	
6 kg	185 mg supp	
7 kg	250 mg per os eller rectalt	
8 kg	250 mg per os eller rectalt	
9 kg	250 mg per os eller rectalt	
10 kg	375 mg per os eller rectalt	100 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
11 kg	375 mg per os eller rectalt	120 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
12 kg	375 mg per os eller rectalt	120 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
13 kg	500 mg per os eller rectalt	140 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
14 kg	500 mg per os eller rectalt	140 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
15 kg	500 mg per os eller rectalt	160 mg mixtur/ 125 mg supp (Nurofen)
16 kg	625 mg per os eller rectalt	160 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
17 kg	625 mg per os eller rectalt	180 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)

Vekt	Paracetamol inntil 40 mg/kg	Ibuprofen (nurofen) 10 mg/kg
18 kg	625 mg per os eller rectalt	180 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
19 kg	750 mg per os eller rectalt	200 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
20 kg	750 mg per os eller rectalt	200 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
21 kg	750 mg per os eller rectalt	220 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
22 kg	750 mg per os eller rectalt	220 mg mixtur/ 185 mg supp (Nurofen)
23 kg	750 mg per os eller rectalt	240 mg mixtur/ 250 mg supp (Nurofen)
24 kg	750 mg per os eller rectalt	240 mg mixtur/ 250 mg supp (Nurofen)
25 kg	1000 mg per os eller rectalt	260 mg mixtur/ 250 mg supp (Nurofen)
26 kg	1000 mg per os eller rectalt	260 mg mixtur/ 250 mg supp (Nurofen)
27 kg	1000 mg per os eller rectalt	280 mg mixtur/ 250 mg supp (Nurofen)
28 kg	1000 mg per os eller rectalt	280 mg mixtur (Nurofen)
29 kg	1125 mg per os eller rectalt	300 mg mixtur (Nurofen)
30 kg	1125 mg per os eller rectalt	300 mg mixtur (Nurofen)
31 kg	1125 mg per os eller rectalt	320 mg mixtur (Nurofen)
32 kg	1250 mg per os eller rectalt	320 mg mixtur (Nurofen)
33 kg	1250 mg per os eller rectalt	340 mg mixtur (Nurofen)
34 kg	1250 mg per os eller rectalt	340 mg mixtur (Nurofen)
35 kg	1250 mg per os eller rectalt	360 mg mixtur (Nurofen)
36 kg	1250 mg per os eller rectalt	360 mg mixtur (Nurofen)
37 kg	1250 mg per os eller rectalt	380 mg mixtur (Nurofen)
38 kg	1500 mg per os eller rectalt	380 mg mixtur (Nurofen)
39 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
40 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
41 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
42 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
43 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 mg per os eller rectalt (Nurofen)
44 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
45 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
46 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
47 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
48 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
49 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)
50 kg	1500 mg per os eller rectalt	400 per os, tbl eller mixtur (Nurofen)

Kryssreferanser

paracetamol og ibuprofen

Kryssreferanser-tabell

[I.3.2-21](#) Smertebehandling av barn - SSHF

Vedleggs-tabell

Eksterne referanser tabell