

Bekkenbetennelse

Gynekologiske bekkenbetennelse skyldes en infeksjon i indre kjønnsorganer hos kvinner. Den er forårsaket av bakterier.

Organene som kan rammes er livmoren, egglederne og eggstokkene. Infeksjonen kan også gå inn i vevet og danne pussansamling (abcess).

Symptomer

Det er ikke alltid lett å avgjøre om du har bekkenbetennelse da symptomene kan være milde. Symptomene kan være smerter i nedre del av magen, unormal utflod, frysninger, feber, smerter i nedre del av ryggen og/eller blødninger.

Undersøkelse

På sykehuset vil en lege gjøre en gynekologisk undersøkelse med ultralyd. Det vil bli tatt prøve fra livmorhalsen for å finne ut hvilke type bakterier det er. Det vil også bli tatt blodprøver for å se om det er en infeksjon i kroppen. Ved typiske symptomer og funn vil legen trolig starte opp behandling.

Behandling

Ved innleggelse startes det med intravenøs antibiotikabehandling. Antibiotika er medisiner som angriper bakterier og virker godt på bekkeninfeksjon. Som oftest trenger en 2-3 dager med intravenøs behandling. Blodprøver viser om medisinene har virket. Ellers vurderer legen om symptomene er blitt bedre. Du kan da reise hjem og ta antibiotika som tabletter. Det er svært viktig at du tar alle tablettene til avtalt tid så lenge kuren varer.

Etter bekkenbetennelse

- Du bør ikke ha samleie eller bade så lenge behandlingen pågår.
- Vær nøye med hygien. Du kan fint dusje.
- Bruk bind og ikke tampong så lenge du får behandling og minst to uker etter utskrivelse.
- Dersom du får feber og smerte etter at behandlingen er avsluttet, kontakt egen lege eller legevakt.
- Avhengig av hvilken bakterie infeksjonen er forårsaket av, kan det være aktuelt med partner behandling.



trygghet når du trenger det mest