

		<b>Klinikknivå</b>			<b>Prosedyre</b>
<b>Gastroskopi, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.6-12</b>		Godkjent dato: <b>01.09.2022</b>	Revideres innen: <b>01.09.2024</b>	Sist endret: <b>02.09.2022</b>	Revisjon: <b>9.00</b>

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: endringer utført jmfr. spl gastrolab

### Forberedelse

- Faste 6 timer før undersøkelsen
- Eventuelt seponere Marevan . INR-svar må foreligge. Vurder behov for seponering av andre antikoagulantia ihht eget skjema
- Eventuelt endocardittprofylakse

### Forberedelse på gastrolab

- Pasienten informeres
- Xylocainspray i svelget
- Veneflon dersom eventuell sedering

### Oppdekking til undersøkelse

- Gastroskopi med tilhørende ventiler og koplinger
- Munnstykke
- Xylocain spray
- Spyleflaske med vannslangesett
- Sugslange + pose
- Hansker
- Vaskebakk med klut
- Evt. 20 ml sprøyte med "minifom vann"

### Biopsitaking

- Biopsitang
- Sprøytespiss
- Kompress
- Biopsiene tas på NaCl, formalin, urease, eller portagerm

### Etter undersøkelsen

Vent 1 time med å spise eller drikke (pga bedøvelse i svelget)

### Rengjøring av gastroskop med tilbehør. Følg nasjonale retningslinjer for vask av skop.

1. Sug gjennom rikelig med vann/enzymsepe (4dl)
2. Sett på blå ventil for sug og blås, og sug igjennom med vann. (Olympus skop)
3. Slå av rec., kast alle engangsventiler
4. Vask skopet utvendig med klut og såpe

*Se egen prosedyre, skyllerom*

**NB! lekkasje test – sjekkes før skopet settes i vaskemaskinen**

### Sklerosering ved blødning

Utarbeidet av: <b>Siri Lindgren</b>	Fagansvarlig: <b>Johan Holck-Steen</b>	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: <b>Nina Roland</b>	Dok.nr: <b>D00749</b>
--	---	--	------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU	<b>Gastroskopi, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.6 -12	Utarbeidet av: Siri Lindgren	Fagansvarlig: Johan Holck-Steen	Godkjent dato: 01.09.2022	Godkjent av: Nina Roland	Revisjon: 9.00

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

### Alternativ 1: Katastrofeadrenalin

Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml – 5 ml trekkes opp og blandes i 100 ml NaCl 9mg/ml  
Engangsnål for injisering

### Alternativ 2: Histoacryl

Se prosedyre: Histoacrylbehandling ved fundus og blødende øsofagusvaricer (lenke under)

### Alternativ 3: Clips

### Alternativ 4: Strikkbehandling av øsofagusvaricer

### Alternativ 5: Gullprobe

### Alternativ 6: APC

### Kryssreferanser

<https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok00057.pdf>

### Eksterne referanser