

		Somatikk Arendal		Prosedyre	
Ekstirpasjon av tumor, hudforandring				Side 1 av 2	
Dokument ID: II.SOA.ØYE.2.8.1-3		Godkjent dato: 02.02.2024	Gyldig til: 02.02.2026	Revisjon: 8.00	

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Operasjon

Indikasjon:

Utføres ved tumor/hudforandringer i øyelokk, kinn eller panne området. Eksempel; BCC, plateepitelkarsinom, nevus, dermoid, lipiom, nevrofibrom, hemangiom.

Preoperativt:

Operatøren merker med kryss hvilken side som skal opereres. Dersom en større plastikk skal utføres, skal operatør avklare og markere dette på forrommet.

Pasienten informeres om operasjonen.

Pasienten dryppes i det aktuelle øyet med tetracain og oxybuprocaine.

Fremgangsmåte:

Utførelse: Markerer felt som skal fjernes på nytt etter desinfisering av felt og dekkematerialet er lagt på. Settes infiltrasjonsanestesi i området (forsiktig med traume mot malign nevus). Tumor/hudforandring fjernes. Det gjøres grundig hemostase før det sys igjen.

Preparatet legges i formalin løsning for det sendes til histologi, print ut strekkode navnlapper på pasientrommet.

Anestesi: Xylocain med adrenalin 10 mg/ml.

Instrumenter:

Legeskrin

Rett saks

Eventuelt vannsaks

Utstyr:

Diatermi eller batterikauter (ved mindre inngrep).

Diatermipose

Knivblad 15

Steril merkepenn

Hullduk drape, eventuelt ekstra dekkestykker med lim.

Bordpose

Lampehåndtak

Tørkepinner

Store og små kompresser

5 ml sprøyte

30 G kanyle

Preparatglass med bufret formalin 4 %

Navnelapper

Histologi skjema

Utarbeidet av: Christine A. Kolaas	Fagansvarlig: Kari-Anne Bosvik	Godkjent av: Espen Ringvold	
--	--	---------------------------------------	--

Dokument-id:
II.SOA.ØYE.2.8.1-3Utarbeidet av:
Christine A. KolaasFagansvarlig:
Kari-Anne BosvikGodkjent dato:
02.02.2024Godkjent av:
Espen RingvoldRevisjon:
8.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Operasjon

Desinfeksjon:

Klorhexidine 0.5 mg/ml

Suturer:

Novosyn 6 -0

Optilene 6- 0

Eventuelt vicryl 8 – 0 rapid til sutur mot margo og en egen sutur til merking av preparat.

Bandasje:

Flytende plaster og steristrips.

Komprimerende bandasje første døgnet.

Post operativt:

Tumor/hudforandring leveres sammen med histologi skjema til patologisk avdeling, husk legens stempel med id nummer.

Suturer fjernes hos fastlege etter syv dager.

Kryssreferanser**Eksterne referanser**