

Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og ved flekkdesinfeksjon

Side 1 av 2

Dokument ID:

1.6.2.6.2.2-9

Godkjent dato:

19.04.2023

Gyldig til:

19.04.2025

Revisjon:

5.01

Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og håndtering av smitte

ISOLERINGSREGIME	SMITTESTOFF	DESINFEKSJONSMIDDEL
LUFTSMITTE	Mycobacterier, åpen lungetuberkulose (tbc), rengjort utstyr og flater	PeraSafe i 10 min.
	Ved andre mikrober:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Synlig forurensede flater se flekkdesinfeksjon. • Ikke rengjort utstyr: 	Virkon 1 % i 30 min.
DRÅPESMITTE	<ul style="list-style-type: none"> • Synlig forurensede flater se flekkdesinfeksjon • ikke rengjort utstyr: 	Virkon 1 % i 30 min
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr: 	Virkon 1 % i 10 min.
KONTAKTSMITTE OG KONTAKTSMITTE MED MUNNBIND	<i>Clostridium difficile toxin (CD)</i> ¹ og diaré av ukjent årsak, rengjort utstyr:	PeraSafe i 10 min.
	Ved andre mikrober:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Synlig forurensede flater se flekkdesinfeksjon. • Ikke rengjort utstyr: 	Virkon 1 % i 30 in.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr: 	Virkon 1 % i 10 min.

PeraSafe anbefales brukt til desinfeksjon av instrumenter

FLEKK-DESINFEKSJON UAVHENGIG AV INFEKSJONSTATUS	Ved søl av blod og andre kroppsvæsker: <ul style="list-style-type: none"> • Bruk hansker • Fjern sølet med oppsugingspapir dynket med desinfeksjonsmiddel • Legg i plastpose som lukkes • Påfør deretter desinfeksjonsmiddel 	Virkon 1 % i 10min. Ved kjent CD og diaré av ukjent årsak eller tbc bruk PeraSafe i 10 min
	Ved inntørket søl: Fukt oppsugingspapiret godt med aktuelt desinfeksjonsmiddel og fjern sølet mekanisk, bruk hansker. Påfør deretter aktuelt desinfeksjonsmiddel på nytt og la virke i 10 min.	

Bruk av sprayflasker er ikke anbefalt ved desinfeksjon. Vanlig rengjøring utføres etter endt desinfeksjonstid.

¹ Ved CD, Vankomycin resistente enterokokker (VRE) og *Acinetobacter baumannii* skal det gjennomføres **daglig** desinfeksjon og renhold av flater og berøringspunkter.

Ved CD: dersom daglig bruk av PeraSafe er ubehagelig for pasienten, kan dette erstattes med såpe og vann, eller rengjørings- og desinfeksjonsklut. Bruk rombundet utstyr.

På rent utstyr og mindre flater, som tåler sprit, kan desinfeksjonssprit 70-80 % anvendes til desinfeksjon. Flaten **må** være synlig ren. **Området som desinfiseres må være godt fuktet, virketid 2-10 min.** Lufttørkes. NB: brukes ikke ved opphør av isolering.

Ved flekkdesinfeksjon og etter pas. med kjent smitte i poliklinikk, kan engangs desinfeksjonskluter brukes.

Utarbeidet av:

Smittevernheten

Fagansvarlig:

Smittevernoverlegen

Godkjent av:

Per Engstrand

Dokument-id:
I.6.2.6.2.2-9Utarbeidet av:
SmittevernhetenFagansvarlig:
SmittevernoverlegenGodkjent dato:
19.04.2023Godkjent av:
Mikkel HøibergRevisjon:
5.01

Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og håndtering av smitte

Rekvisisjon

Avdeling/post:..... Romnr:.....

Husøkonom kan nås på tlf.

SSA: 4371 frem til kl. 21.30 hver dag mandag til søndag

SSF: dagtid: 5171, kveld/helg: 91140982 eller 7107 (før kl. 20)

SSK: 3018 man. – søn. kl. 07:00 – 21:00 (Akuttmottak til kl. 21:30)

Isoleringsregime:

Luftsmitte Dråpesmitte Kontaktmitte Kontaktmitte m/munnbind

Desinfeksjonsmiddel/-konsentrasjon:

PeraSafe Virkon 1 % Desinfeksjonstid: 10 minutter Ved synlig søl av blod eller andre kroppsvæsker
utføres flekkdesinfeksjon.Ved isolering ved prionsykdom og viral hemorragisk feber kontaktes hygiene-sykepleier.
Se også sykehusets retningslinjer for isolering

Rommet vil være ryddet og klargjort for desinfeksjon og rengjøring klokken:.....

Medisinsk utstyr er desinfisert av:.....

Eventuelle andre opplysninger:

Rekvirert telefonisk dato:.....

Klokken:.....

Utfylt av (navn):.....

FYLLES UT AV HUSØKONOMAVDELINGEN

Rommet er ferdigstilt av (navn):.....

Dato:.....

Klokken:.....

Eventuelle anmerkninger:

Kryssreferanser

[I.6.2.6.2.2-2 Tiltak ved isolering](#)[I.6.2.6.2.2-1 Infeksjonssykdommer - alfabetisk liste](#)

Eksterne referanser:

[Desinfeksjonsmidler - veiledning - Legemiddelverket](#)[I.6.2.6.2.2-10 Ansvarsfordeling ved smittevask](#)