

Cystoscopi med fjerning av JJ-stent SSA

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOA.APP.POL.2.U-8

Godkjent dato:

08.06.2023

Gyldig til:

08.06.2025

Revisjon:

5.02

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Kir./Gyn./Ort. polikl. SSA/Pasienter og brukere/Urologi

Hensikt

Fjerne stenten som ligger fra blæra opp til nyrebekkenet.

Omfang

Pasienter som har vært til ESWL-behandling (steinknusing).

Pasienter som av andre årsaker har hatt behov for midlertidig drenerasje med JJ-stent.

Utstyr

- Fleksibelt skop
- Trekk til skop
- Krokodilletang
- Kateteriseringssett
- Evt penisklype
- Xylocain gel 2%
- 1 liter NaCl og i.v.-sett
- Klorhexidin 0,5mg/ml

Handling

- Pleier hilser på pasienten og informerer om undersøkelsen. Pasienten legger seg på benken.
- Sykepleier vasker genitalia med Klorhexidin 0,5 mg/ml, og lokalbedøvelse settes inn i urethra hos menn. Bruk penisklype hvis behov
Dette bør virke ca. 10 min.
Hos kvinner er det legen som vasker og setter lokalbedøvelse inn i urethra.
- Pasienten dekkes til med håndkle/stikkelaken mens han venter på legen.
- Vi assisterer legen under undersøkelsen.
- Vi informerer pasienten om at han/hun må drikke mye etter undersøkelsen, og at det kan komme blod eller svie ved vannlatingen. Ved symptomer på urinveisinfeksjon må han/hun ta med urinprøve til egen lege.
Pasienten får med seg skriftlig informasjon om dette.

Rengjøring av utstyr

- Bruk hansker ved håndtering av utstyr.
- Skop tørkes med egne fuktete wiper
- Krokodilletang vaskes og sendes til sterilisering

Kryssreferanser**Eksterne referanser**

Utarbeidet av:

G. Bjørneboe/M. Halvorsen

Fagansvarlig:

Aage V. Andersen

Godkjent av:

Mette Dobler Hamre