

Hernie - brokkplastikk hos barn Operasjonsenheten SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.ur-2

Godkjent dato:

11.07.2022

Gyldig til:

11.07.2025

Revisjon:

6.02

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Urologi

Lager Gyn/Uro		
Ant	Beskrivelse	Reol
1	Uro barnerist	5
Evt	Suturbrett + øyelokkshaker	5 + 19
2	Frakk	2
1	Universalsett til barn	3
1	Vaskesett	4
1+1	Lampehåndtak	4
1	Bipolar diatermi	8
Evt	Vesselloop	12
1	Opptrekkskanyle	12
1	Kanyle blå (evt orange)	12
1	Sprøyte 5 ml	12
1	Kompresser 4 lags	13
Evt	Kompresser 10x10	13
2	Tupfere micro	13
Evt	Tupfere nr 0	13
1	Mepore bandasje	13
1	Steristrip 3mm	13
Evt	Monopolar diatermi	14
Suturer		Nål
	Novosyn 4-0	HR22
Evt	Novosyn 3-0	HR22
	Monosyn quick 5-0	DSMP13
Evt	Monosyn quick 4-0	DSMP13
Væskelager		Reol
Marcain 2,5mg/ml		
(Barn under 10 år/ vektavhengig: Terje Wold bruker 20 ml a 2,5mg/ml Marcain blandet med 20 ml a NaCl 9mg/ml)		

Leiringsbeskrivelse

Ryggleie

Desinfeksjon og dekking

Klorhexidin 0,5 mg/ml til barn under 1 år.
Klorhexidinsprit 5mg/ml til barn over 1 år.
Vask abdomen, lysker, scrotum og penischaft.

Firkantdekking.

MTU

Kls martin maxium program: pediatri
Bipolar diatermi som første valg.
Monopolar diatermi (Terje Wold).

Operasjonsbeskrivelse

Skråsnitt i lysken.
Identifiserer brokksekken som isoleres, fjernes og lukkes.
Hemostase og lagvis lukking.

Utarbeidet av:

Aase Mette Kjenes

Fagansvarlig:

Aase Mette Kjenes

Godkjent av:

Fredrik Jensen