

TRICODUR GILCHRIST - HUMERUS/SKULDERBANDASJE AKUTMOTTAK-SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.MEK.SSK.2.a.1.1-10

Gruppe:

Skadepoliklinikk

Godkjent dato:

01.10.2021

Gyldig til:

01.10.2023

Revisjon:

4.01

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

BAKGRUNN:**Hensikt**

Smertelindring og immobilisering for å oppnå god bruddtilheling. Bandasjen skal være på i maks. 14 dager for å forhindre stivhet i albue- og skulderledd

Omfang

Gjelder pasienter med humerusfrakturer og skulderskader

HANDLING:**Lege har ansvar for:**


- Smertebehandling
- Pålegging av Tricodur Gilchrist i samarbeid med sykepleier
- Informere pasienten

Sykepleier har ansvar for:

- Klargjøre bandasjen
- Evt. gi smertestillende *før* pålegging av bandasjen
- Pålegging av bandasjen i samarbeid med legen

Fremgangsmåte:

- Armen føres inn i bandasjens åpning. Bandasjen trekkes først så langt opp til fingerspissene blir synlig på slutten av mansjetten. Ta nå tak i håndleddet og trekk bandasjen over hele armen opp til skulderleddet. Bandasjen føres så frem over skulder og nakke
- Den skadde armen plasseres med en vinkel på 90 grader. Beltet føres så gjennom under håndleddet og oppover og festes med borrelås på den andre delen
- Beltet på mansjetten føres rundt ryggen og slås rundt innenfra og utover i den nedre delen på overarmen
- Beltet føres nå tilbake og fikseres med borrelås på den andre delen på ryggen
- Evt. ”pute” i armhulen



Eksterne referanser: Tricodur Gilchrist Bruksanvisning som følger bandasjen.

Utarbeidet av:

K. Langmyr spl

Først utgitt:

09.01.2006

Fagansvarlig:

Seksjons o.l
Benedicte Severinsen

Godkjent av:

Benedicte Severinsen