

		<b>Somatikk Kristiansand</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Paracentese med innleggelse av dren - ØNH, SSA</b>				Side 1 av 1	
Dokument ID: <b>II.SOK.ØNH.SSA.2.b-12</b>		Godkjent dato: <b>22.08.2023</b>	Gyldig til: <b>22.08.2025</b>	Revisjon: <b>6.04</b>	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

PARACENTESE – dvs. stikker hull på trommehinnen for å skaffe avløp fra mellomøret. Drenet opprettholder luft- og trykkutjevning til mellomøret, slik at væskedannelse og undertrykk unngås.

**UTSTYR:**

Mikroskop

Utstyr fra st.13:

1 Paracentesebrett

2 ventilasjonsrør / øredren (ikke åpne før legen gir beskjed om det)

1 grønt øresug

1 hvit øresug

1 mellomstykke til sug

1 sugeslange

1 stk. 10x10 cm. kompress

1 klinidrape uten lim (til dekking av bordet) – deles i to

Utstyr fra overskap utenfor st.13:

1 flaske NaCl

**LEIE:**

Rygg.

**HUDESINFEKSJON:**

Ingen vask

**DEKKING:**

Ingen dekking

**OPERASJONSFREMANGSMÅTE:**

Ved sekretorisk mellomørebetennelse (Otitis Media Sekretoria) hos barn, settes dren i trommehinna. Dette for å slippe luft fra øregangen til mellomøret.

Via mikroskop gjennom øretrakt i øregangen punkteres trommehinnen med paracentesekniv eller paracentesenål/gul, lang kanyle. Sekret suges ut. Dren settes inn med krokodilletangen. Legen bestemmer hvilke type dren som skal legges inn.

Utarbeidet av: <b>Angela Wallin Larsen</b>	Fagansvarlig: <b>Jorunn Sandvik</b>	Godkjent av: <b>Avd.leder Ellen Mjøs</b>	
-----------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------	--