

		Somatikk Arendal		Retningslinje
ECCE- extracapsular cataract extraction				Side 1 av 3
Dokument ID: II.SOA.ØYE.2.8.1-12		Godkjent dato: 22.08.2024	Gyldig til: 22.08.2026	Revisjon: 7.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Operasjon

Indikasjon:

Komplikasjoner som oppstår under katarakt operasjon, eller eventuelt planlagt inngrep, på grunn av hard kjerne (hvit katarakt) fører til at man må utføre en extra capsular ekstraksjon, ecce.

Pre operativt:

På forrommet: Dryppes med Oxibuprocain x2, voltaren x2, cyclopentolat x2, metaoxidrine x2 i det aktuelle øyet. Dersom liten pupille, drypp ekstra med cyclopentolat og tropicamid.

Gis 5 mg vival.

Like før pasienten går til operasjon, dryppes med tetracain x 1.

Fremgangsmåte:

Utførelse: Phaco maskin startes og primes (I- A). Snitt legges med 4. 1 mm kniv ved limbus. Linsen tas ut i sin helhet med hjelp av vectis kanyle på en 2 ml sprøyte. Sutureres.

Anestesi/medikamenter: Subconjunktival og intrakameral bedøvelse med Lidokain 10 mg/ml og 0,1 ml aprokam 50 mg post operativt.

Utarbeidet av: Ranja Gonsholt Evensen	Fagansvarlig: Christine Aanstad. Kolaas	Godkjent av: Espen Ringvold	
---	---	---------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Katarakt - ECCE Øyeavdelingen SSA				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.1-12	Utarbeidet av: Ranja Gonsholt Evensen	Fagansvarlig: Christine Aanstad. Kolaas	Godkjent dato: 22.08.2024	Godkjent av: Espen Ringvold	Revisjon: 7.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Operasjon

Instrumenter:

Phaco skrin

Diatermi koblet til phaco maskin

Sett med høyre/venstre sakser

Skjelehake

Moorfield pinsett

Vannasaks

Mål

Nåleholder

Knytepinsett

Utstyr:

Katarakt oppdekkingspakke

Vectis kanyle på 2 ml BSS-sprøyte

4,1mm kniv

Healon

Discovisc

500 ml BSS+ tilsatt 0,5ml Adrenalin 1mg/ml

Kanyle 30G

Desinfeksjon:

Betadine 5 %

Suturer;

Nylon 10- 0

Eventuelt holdesutur, silkam 6- 0.

 SØRLANDET SYKEHUS	Katarakt - ECCE Øyeavdelingen SSA				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.1-12	Utarbeidet av: Ranja Gonsholt Evensen	Fagansvarlig: Christine Aanstad. Kolaas	Godkjent dato: 22.08.2024	Godkjent av: Espen Ringvold	Revisjon: 7.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Operasjon

Bandasje:

Fotil forte eller pilocarpine 2 % dråpe, kloramfenikol salve og eventuelt et øyeskjold.

Post operativt:

Pasienten skal ta det med ro i en uke, være forsiktig med å bøye seg og løfte tungt. Øyedråper etter avtale med kirurg. Andre dråper pasienten tar, for eksempel for glaukom, fortsettes med som vanlig. Eventuelt diamox depot tabletter som behandling post operativt. Ellers forholde seg til infoskrivet pasienten får med seg. [Legge inn link.](#) Kontroll hos øyelege etter 1- 7 dager.

Kryssreferanser

Eksterne referanser