

		Somatikk Kristiansand		Prosedyre	
Øregangsplastikk ytre, ØNH, SSA					
Dokument ID: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-19		Godkjent dato: 26.10.2023	Gyldig til: 26.10.2025	Side 1 av 2 Revisjon: 7.03	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Gjøres ved for trange øreganger som er medfødt.

UTSTYR:

Utstyr fra Sterilsentralen: Småkirurgi instrumenter

Utstyr fra st.13:

- Knivblad nr.15
- 1 stort hullaken
- 1 litet hullaken
- 1 bordtrekk
- Lampehåndtak
- 1 grønt øresug
- 1 mellomstykke til øresug
- Sugeslange
- 1 pk. opr.kompresser
- 1 stk. 2 cm. tampong
- 1 pr. hansker nr. 6 (til dekking av håndtak på mikroskop)
- 10 ml. sprøyte med luer lock
- 1 stk. mini-spike
- 1 stk. grå lang kanyle
- Terracortril salve
- Vaskesett
- 1 Diatermipose
- 1 Selvklebende bandasje 10x10 cm (Adhesive surgical dressing)
- Suturer: Dafilon 5-0 på liten nål

Utstyr fra lager utenfor st.:13

- 1 liten øretang/ hartmannstang
- 1 nesespekel
- Liten bipolar diatermi
- Xylocain m./adrenalin 10 mg./ml.
- usteril sprit 70 % (til huddesinfeksjon)

HUDDESINFEKSJON:

Øret, og to fingerbredder rundt øret, vaskes med usteril sprit 70%. Vask med vattpinner inne i øret, men ikke innerst i øregangen.

LEIE:

Rygg, hodet vendt mot siden – det syke øret opp.

DEKKING:

Hullakenet legges rundt øret.

OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:

Mikroskopet dekkes kun med en hanske nr.6 på hvert håndtak.

Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	
---	--	---	--

Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-19	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent dato: 26.10.2023	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 7.03
---------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Huden spaltes ytterst i øregangen med en incisjon.
Suturering. Tampong med salve legges i øregangen.

HVORDAN VI LEGGER BANDASJEN:

Bandasjen teipes først bak øret og så over øret. Bandasjen skal ligge på til pasienten kommer til kontroll på poliklinikken.