

Småkirurgiske inngrep i lokalanestesi. Kirurgiske senger, kir. pol. SSK

Side 1 av 2

 Dokument ID:
II.SOK.KSK.POL.2.GEN-1

 Godkjent dato:
09.04.2024

 Gyldig til:
09.04.2026

 Revisjon:
12.01

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Kir.pol/Pasienter og brukere/Generelt

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Sykepleier er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Hensikt: Å sikre faglig, forsvarlig sykepleie/ behandling til pasienter etter ulike myndighetskrav og krav i interne retningslinjer / prosedyrer.

Definisjon: Gjelder pasienter som er henvist fra primærhelsetjenesten for å få utført småkirurgisk inngrep og skal sikre pasienten optimal behandling

Fremgangsmåte:

Utstyr:

- Sterile hansker + munnbind + oprhette
- Vaskesett
- Klorhexidin 5mg/ml m/ sprit på hel hud
- Klorhexidin 0,5mg/ml på slimhinner
- Xylocain 10mg/ml eller 20 mg/ml (m/eller u/adrenalin)
- Sprøyte + opptrekkskanyle + s.c kanyle
- Småkirurgi-sett
- Sterile kompresser 10 x 10cm etter behov
- Hullstykke, evt. klinidrape 75x75
- Knivblad nr.15
- Suturer
- Bandasjer
- Steril tusj, formalinglass, navnlapper
- Ved fjerning av negler: skarp skje + strikk
- Ved fimose opr:
 - Bupivacaine 2,5mg/ml eller 5mg/ml
 - Terra Cortril 30mg/10mgsalve
 - Svanehals
 - Novosyn Quick 3.0/4.0/5.0
 - Monosyn Quick 4.0
 - Lampeholder
 - Kompresser + Gasbind til fiksering av penis
 - Tena bleie for menn/dryppsamler


Ansvarlig sykepleier:

- Informer pasienten om inngrepet
- Desinfiser operasjonsfeltet og foreta steril oppdekking. Se vedlegg under.
- Assister legen under inngrepet
- Legg preparatet på navnermerket formalinglass (navnlappen tas ut fra bestillingen på klinisk kjemisk under patologi) Formalinglasset skal inneholde 1 del preparat og 9 deler formalin, samt ikke ligge å duppe i øvre kant/overflaten. Legg derfor en liten kompress/papirbit i overflateskorpen på glasset så holder preparatet seg fuktig hele tiden. Prøven leveres til patologisk avdeling. Dersom det leveres flere prøver skal antall beholdere registreres i bestillingen, og det skal skrives tall med kulepenn på glassene.
- Informer pasienten etter inngrepet:
 - Blødnings – og infeksjonsfare.

 Utarbeidet av:
Elianne Wathne

 Fagansvarlig:
Hans Joachim Hauss

 Godkjent av:
Mette Christine Emanuelsen

 SØRLANDET SYKEHUS		Småkirurgiske inngrep i lokalanestesi. Kirurgiske senger, kir. pol. SSK			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.KSK.POL.2.GEN-1	Utarbeidet av: Elianne Wathne	Fagansvarlig: Hans Joachim Hauss	Godkjent dato: 09.04.2024	Godkjent av: Mette Christine Emanuelson	Revisjon: 12.01

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Kir.pol/Pasienter og brukere/Generelt

- Smertestillende etter legens forordning
- Dusjing etter 2 dager
- Bruk gjerne Micropore-tape i 3 mnd. etter inngrepet for å få penere arr
- Unngå direkte sol på arrene 3 mnd. etter inngrepet
- Del ut pasientinformasjonen «Sårbehandling etter operasjon i lokalbedøvelse»

Kryssreferanser

[I.6.2.6.2.1.7-1](#)

[Desinfeksjon av hud og slimhinner](#)

[II.SOK.KSK.POL.2.GEN-](#)

[Desinfeksjon av operasjonsfelt](#)

[4](#)

[Kir.pol SSK - Kirurgiske senger SSK](#)