

Vasodilaterende medikamenter til intracoronar bruk, PCI/SSA

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-11

Godkjent dato:

30.10.2024

Gyldig til:

30.10.2026

Revisjon:

6.01

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

Intracoronar = ic

INDIKASJON:

- "No Reflow" fenomen (perifer embolisering) ved PCI
- Vasodilasjon

ADENOSIN:

0,6ml Adenosin 5mg/ml blandes i 100ml NaCl 9mg/ml.

Dette gir en konsentrasjon på ADENOSIN 30µg/ml

Fra denne blandingen trekkes det opp det antall mikrogram som legen forordner:

Trek opp 1 ml = 30µg Adenosin pr 5 ml sprøyte.

Hver sprøyte fylles deretter opp med 4 ml NaCl 9mg/ml til en total blanding på 5 ml.

Det er vanlig å blande 3-4 sprøyter på en gang.

GLYSERYLNITRAT:

1 ml Glycerylnitrat 1 mg/ml blandes med 9 ml NaCl 9 mg/ml

Dette gir en konsentrasjon på 0,1mg/ml, til ic.bruk.

NITROPRESS (Nitroprusside):

Gis intravenøst på volumpumpe. Spør Coronar om hjelp til blandingen.

NB!

All medisin intracoronart gis av lege. Steril prosedyre ved tillaging av den medisin-konsentrasjon som gis ic.