

Delhudstransplantasjon Kirurgiske Senger SSK, post 3C

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.KSK.3C.2..3-6

Godkjent dato:

20.07.2023

Gyldig til:

20.07.2025

Revisjon:

5.01

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere og hjelpepleiere.

Hensikt: Å sikre at pasienten får forsvarlig og god sykepleie/behandling.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Sykepleier som utfører prosedyren er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Definisjon: Transplantasjon av hud p.g.a. brannskade, sår eller traume.

<p>Fremgangsmåte/ gjennomføring: Preoperativt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Forundersøkelser: blodprøver, rtg. thorax, Ekg, pre- og post-operativ fysioterapi, samtale med sykepleier, turnuslege, kirurg og anestesilege etter prosedyre Blodprøver: Kir/ort profil + INR hvis pasienten bruker Marevan Bestill INR og evt. fastende blodsukker som «straks/akuttprøve» til kl. 06.30 operasjonsdagen. Kirurg må «merke» pasienten før operasjon Faste fra kl. 24.00 – ikke spise fast føde etter kl. 2400. Kan drikke vann/saft/te/kaffe uten melk frem til 2 timer før oppmøte. Kan røyke, snuse, tygge tyggegummi eller suge på drops frem til 2 timer før oppmøte. Medisiner som skal operasjonsdagen kan svelges sammen med et lite glass vann frem til 1 time før operasjonen Samtale med turnuslege, kirurg, anestesilege og sykepleier Evt. EKG Rtg. Thorax – forordnes av lege Tromboseprofylakse kvelden før - forordnes av lege Venekanyle 	<p>Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK</p> <p>Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF</p> <p>Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF</p> <p>Preoperativ faste - Voksne - SSF</p> <p>Hudtransplantasjon Pasientinformasjon SSHF</p> <p>PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF</p>
<p>Operasjonsdagen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dusje, rent tøy og ren seng Hårfjerning i operasjonsområdet Premedikasjon etter forordning av lege Antibiotika profylakse dersom indisert. Første dose gis under oppstart av operasjon Blodsukker svar hvis diabetes - insulindrypp INR svar hvis Marevan 	<p>Premedikasjon voksne pasienter, Anestesi SSK</p> <p>Preoperativ hårfjerning, SSHF</p> <p>Antibiotikabruk i sykehus - nasjonal veileder, godkjent i SSHF.</p> <p>Diabetes, innleggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK.</p>
<p>Postoperativt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hud/Hygiene: 	<ul style="list-style-type: none"> Bandasjer over transplantasjonen, og evt. VAC bandasje, åpnes 5. p.o. dag. Husk å observere donorsted ifht infeksjon, og se etter at bandasjene ikke glir (grundig bandasjering) Donorsted skal vanligvis ikke skiftes de første dagene med mindre det er mistanke om infeksjon 	
<ul style="list-style-type: none"> Mobilisering: 	<ul style="list-style-type: none"> Immobilisering av pasient i 5 dager dersom hudtransplantatet på underekstremitet er bandasjert uten VAC, dvs. at pasienten kan opp i rullestol med foten hevet og i ro 1. p.o. dag. Pasienten kan ikke gå med krykker og lignende, med mindre operatør har gitt annen beskjed. Enkelte pasienter kan ha do-lov, men dette må avtales med kirurg individuelt. 	

 SØRLANDET SYKEHUS		Delhudstransplantasjon Kirurgiske Senger SSK, post 3C, Post 4A			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.KSK.3C.2..3-6	Utarbeidet av: Karin Moi	Fagansvarlig: Andreas Nygaard	Godkjent dato: 20.07.2023	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	Revisjon: 5.01

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

<ul style="list-style-type: none"> • Smerter/velvære 	<ul style="list-style-type: none"> • Basis/fast medikasjon - Obs. virkning/bivirkning etter NRS skala <ul style="list-style-type: none"> - Paracet 1g x 4 - Evt. medikamenter ved behov - forordnet av lege 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ernæring: 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasienten kan spise ved ankomst avdeling 	
<ul style="list-style-type: none"> • Utskrivning 	<ul style="list-style-type: none"> • Utskrivning etter transplantatet er avdekket • Kontrolltime ved behov • Resept smertestillende ved behov • Evt. sykemelding 	

Kryssreferanser

- 1) [Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)
- 2) [Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)
- 3) [Antibiotikaprofylakse - basert på nasjonal retningslinje](#)
- 4) [PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF](#)
- 5) [Preoperativ faste - Voksne - SSFPreoperativ faste - Voksne - SSF](#)
- 6) [Diabetes, inneliggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK.](#)
- 7) [Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

Eksterne referanser