

		Somatikk Kristiansand		Prosedyre	
PVK (veneflon) ved cytostatikabehandling Med.avd SSK				Side 1 av 1	
Dokument ID: II.SOK.MEK.MEK.2.2.HEM-8		Godkjent dato: 03.01.2024	Gyldig til: 03.01.2026	Revisjon: 8.00	

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

HENSIKT

Sikre riktig og god administrasjon av cytostatika og unngå ekstravasal infusjon. Gjelder for sykepleiere som skal administrere infusjon av cytostatika.

HANDLING

- * informer pasienten om aktuell handling
- * ta av evt. ringer og klokke på armen du skal bruke
- * god håndhygiene
- * bruk blå eller rosa veneflon, regelen er minst mulig veneflon i størst mulig åre
- * bruk gjerne varmebad eller legg på en hanske med varmt vann noen minutter for å få frem gode vener
- * veneflonen skal helst legges i en storkalibret vene i den ikke dominante armen (venstre for høyrehendt og høyre arm for venstrehendt)
- * legges helst på underarm slik at spissen ikke er i nærheten av sener og ledd, eller på håndbak
- * ved perforasjon, - legg ny veneflon ovenfor perforasjonsstedet slik at det ikke lekker ut medikament fra den perforerte venen.
- * kontakt anestesiavdelingen ved behov
- * kontroller at det er god tilbakeflow gjennom veneflonen, dette skal sjekkes av to sykepleiere før oppstart
- * ikke dekk til veneflonen under infusjonen, viktig å sjekke infusjonssted med tanke på ekstravasasjon
- * legg gjerne armen på en pute, se til at armen hviler godt

UTSTYR

- * klorhexidin 5 mg/ml
- * staseslange
- * venekanyle, helst blå, evt rosa
- * rød propp, evt forlengelseslange m/treveiskran
- * 10 ml NaCl 9 mg/ml til skylling
- * Tegaderm sterilt plaster til fiksering av kanylen
- * hansker

OBSERVASJON

Under infusjonen må venekanylen sjekkes med jevne mellomrom for å unngå fare for ekstravasasjon. Be pasienten gi beskjed hvis det oppstår ubehag/svie i veneflonen/armen. Etter endt behandling, skal det skylles godt med NaCl 9mg/ml, - fjernet veneflon skal i risikoavfall.

Kryssreferanser

[I.3.13-13](#)

[PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF](#)

Utarbeidet av: Hilde S. Balchen	Fagansvarlig: Hilde S. Balchen	Godkjent av: Wibecke Falkum	
---	--	---------------------------------------	--