

		Foretaksnivå		Prosedyre	
Hypervolemi i hemodialysebehandling- SSHF				Side 1 av 1	
Dokument ID: 1.4.4.1-2		Godkjent dato: 22.08.2023	Gyldig til: 22.08.2025	Revisjon: 6.04	

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

HENSIKT

Sikre forsvarlig behandling av pasienter med hypervolemi i hemodialyse.

OMFANG

Sykepleiere som arbeider med hemodialyse.

HANDLING

- Pasienten veies før hver dialysebehandling.
- **SSA:** Ta BCM ved behov
- Observere vektøkning, tungpust, evt halsvenestuvning og perifere ødemer.
- Måle blodtrykk og puls ved behandlingsstart.
- Vurdere ut fra vekt og blodtrykk hvor mye væske som skal trekkes i forhold til tørrvekt.
- Sett evt. inn isolert ultrafiltrasjon/UF-profil.
- Evt. O2-behandling.
- Måle og observere blodtrykk, puls og respirasjon under behandlingen.
- Ved store væsketrekk, vær ekstra oppmerksom på blodtrykksfall og kramper.

Kryssreferanse

[Gjennomføring Hemodialyse-SSHF](#)

Eksterne referanser

Eidemak I., Thomas E.J., Rix M. – *Dialyse 3. Udgave* – 2011 Mai, FADL's Forlag, København, Denmark.

Utarbeidet av: Trine Johnsen, Anita R Vistnes, Anne Margrete Ekeland	Fagansvarlig: Marianne Klausen, Trine Johnsen	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	
---	---	---	--