

		<b>Somatikk Kristiansand</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>SEPTUMPLASTIKK, ØNH, SSA</b>				Side 1 av 2	
Dokument ID: <b>II.SOK.ØNH.SSA.2.b-13</b>		Godkjent dato: <b>20.11.2024</b>	Gyldig til: <b>20.11.2025</b>	Revisjon: <b>7.06</b>	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Skjev neseskillevegg rettes opp.

### **UTSTYR:**

Utstyr fra sterilsentralen: Septumbrikke

Utstyr fra st. 13:

Sett til innleggelse av bedøvelse  
 2 gasstamponger (sterile)  
 1 stk. Mini-Spike  
 Vicryl/Novosyn 3-0 PS-2 nål (Olsson : Vicryl 4-0 DS 19) (Sourani: Vicryl 4-0 DSMP 13)  
 Ethilon/Dafilon 3-0 DS-19 nål  
 1 frakk  
 2 boller  
 Kameratrekk  
 Tynt bøyd sug (Olsson)(Ribe)(Valvik)  
 Rett sug (Olsson) (Sourani)

Utstyr fra lager utenfor st. 13:

Nesesett  
 2 stk. merocel tamponger, lange  
 1 pk. lameller  
 Optikk 0 grader  
 Mellomstykke  
 Lysledning

Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor st. 13:

Terracortril salve  
 Tetracain med adrenalin hetteglass  
 Xylocain 10 mg./ml. m./adr., hetteglass

### **LEIE:**

Ryngleie m./ lett hevet hodeende.

### **PRE-OPR.FORBEREDELSE:**

Kirurgen legger inn gastamponger fuktet med Tetracain m./ adr. i pasientens nesebor. Dette gjøres FØR VI  
**VASKER PASIENTENS NESE.**  
 Xylocain 10 mg./ml. m. adr. injiseres ETTER AT VI HAR VASKET PASIENTENS NESE.

### **HUDESINFEKSJON:**


Vaske nesa og området rundt med klorhexidin 0,5 mg/ml.

### **DEKKING:**

Legg U-lakenet under pasientens nese og oppover langs nesen på hver side. Håndkleet med lim legges fra overkant av nesen og oppover.

### **OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:**

Utarbeidet av: <b>Angela Wallin Larsen</b>	Fagansvarlig: <b>Øystein Haugen</b>	Godkjent av: <b>Marte J. Hosøy Novik</b>	
---	--	---	--

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>SEPTUMPLASTIKK, ØNH, SSA</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-13	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Øystein Haugen	Godkjent dato: 20.11.2024	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 7.06

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

En skjev neseskillevegg kan være medfødt eller skyldes et traume. Ved operasjonen skjærer kirurgen gjennom slimhinnen på den ene siden av neseskilleveggen og slimhinnen løsnes fra brusken. Brusken formes og ofte fjernes også en del av brusken. Ben meisles vekk med en hammer.

Slimhinnen lukkes med Novosyn.

Lameller settes inn og sutureres med Dafilon.

Setter inn Meroceltamponger m./Terra-cortrialsalve i pas. nesebor ved opr. slutt. Injiserer Xylocain 10 mg./ml. m./adr. i tampongene. Trådene på tampongene tapes opp på pas. nese, og klippes korte. Evt. Nesebandasje/Miro-nosepad under pas. nese.