

 Somatikk Kristiansand		Retningslinje
Multitraume - fysioterapi tiltak AFR		Side 1 av 3
Dokument ID: II.SOK.AFR.2.1.1-15	Godkjent dato: 05.03.2025	Gyldig til: 05.03.2026
		Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Fagprosedyrer og Pasientrelaterte tema/Spesialisert rehabilitering/Multitraume

Hensikt

Hensikten med dokumentet er å kvalitetssikre behandlingen fysioterapeuter ved Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR), Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR), Klinikk Kristiansand, SSHF, gir til multitraumepasienter.

Gjelder for

Dokumentet gjelder for fysioterapeuter ved ESR som behandler pasienter med multitraume.

Grunnlagsinformasjon

Pasientgruppen har ulike, individuelle behov ettersom hver pasient har et unikt skadeomfang. Man må i behandlingen finne en balansegang mellom fysioterapi og generell aktivitet, og ta hensyn til de begrensninger og restriksjoner pasienten har med hensyn til belastning og bevegelighet. Det er svært viktig at pasienten mobiliseres raskt for å unngå komplikasjoner og forebygge senskader.

Handling

Pasienten kommer fortrinnsvis til fysioterapiavdelingen for behandling/ trening, men får ved behov behandling på rommet/ i enheten.

Pasienten behandles individuelt av fysioterapeut på alle virkedager. Avhengig av omfanget av skaden, prioriteres det utvidet behandlingstid. Pasienten får et tilpasset egentreningsprogram. All forflytning og ADL anses som trening og kan derfor observeres jevnlig og instrueres ved vansker.

Hovedmål for behandlingen er å oppnå best mulig funksjon.

På grunn av stor variasjon i skadenes omfang og sammensetning, blir retningslinjen for behandling av generell art. Eventuelle restriksjoner må følges nøye. Pasienten trenger å få best mulig og gjentatt informasjon om sin situasjon og prognose.

Profylaktisk behandling

MÅL	TILTAK
Forebygge decubitus	• Stillingsforandring ved sengeleie • Gjennombeveging ved hjelp av personale (pleiegruppe og terapeuter) dersom pasienten ikke kan bevege selv. • Aktivitet • Informasjon
Forebygge kontraktur	• Stillingsforandring ved sengeleie • Ståtrening • Øvelser • Tøyninger
Forebygge trombose	• Aktivitet, helst aktivt, men gjennombeveging dersom pasienten ikke selv klarer å bevege. • TED-strømpe ved betydelig ødem, avklares med behandlende lege

Utarbeidet av: Inger Lise Sørensen	Fagansvarlig: Inger Lise Sørensen	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	
--	---	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS		Multitraume - fysioterapi tiltak AFR			Side: 2
Dokument-id: II.SOK.AFR.2.1.1-15	Utarbeidet av: Inger Lise Sørensen	Fagansvarlig: Inger Lise Sørensen	Godkjent dato: 05.03.2025	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Av: 3 Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Fagprosedyrer og Pasientrelaterte tema/Spesialisert rehabilitering/Multitraume

Fysioterapibehandling/ trening

MÅL	TILTAK
Redusere smerte	• Stillingsforandring ved sengeleie • Aktive/passive øvelser • Redcord • Bløtvevsbehandling • Avspenning • Informasjon • TENS
Bedre forflytningsevne	• Forflytningstrening (samordne med ergoterapeut og pleiegruppe slik at forflytning blir lik for den enkelte pasient) • Vurdere behov for forflytningshjelpemidler • Aktive/passive øvelser
Bedre gangfunksjon - OBS! Belastningsrestriksjoner	• Gangtrening, inne/ute/trapp med mer • Aktuelle øvelser • Ganghjelpemidler
Bedre selvstendighet i ADL	• Øvelser • Instruksjon/trening i de aktuelle problemstillingene
Bedre bevegelse, stabilitet og styrke i/rundt affiserte ledd OBS! Tilstøtende ledd	• Aktive/passive øvelser • Tøyninger • Gjennombevegelse dersom pasienten ikke klarer å bevege selv • Redcord • Ergometersykel/motomed • Arrmassasje
Hindre tap av benvev og muskelatrofi	• Ståtrening • Gange • Øvelser
Synliggjøre pasientens ressurser og mål	• Rehabiliteringsplan • Samtale med pasienten underveis i behandlingsforløpet
Tilrettelegging av bosituasjon	• Hjemmebesøk med ergoterapeut • Permisjon før utskriving
Ivareta pasientens psykiske helse ift traumat	• Samtale • Observere pasientens tilstand • Meddele observasjoner til tverrfaglig team

OBS! Mulige komplikasjoner/senvirkninger:

- perifere nerveskader
- kroniske smerter
- sekundær artrose
- forkalkning ledd/ muskulatur
- redusert bevegelse

 SØRLANDET SYKEHUS	Multitraume - fysioterapi tiltak AFR				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AFR.2.1.1-15	Utarbeidet av: Inger Lise Sørensen	Fagansvarlig: Inger Lise Sørensen	Godkjent dato: 05.03.2025	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Fagprosedyrer og Pasientrelaterte tema/Spesialisert rehabilitering/Multitraume

- redusert muskelstyrke i skadet område
- dyp venetrombose
- Chronic Regional Pain Syndrome (CRPS)

Noen av disse komplikasjonene utvikles først etter at pasient er utskrevet herfra, men viktig å observere i forhold til det.

Kryssreferanser

[Individuell rehabiliteringsplan- Enhet for spesialisert rehabilitering, AFR](#)

[Multitraume- om multitraume, AFR](#)

[Multitraume- tverrfaglig kartleggingsverktøy, AFR](#)

[Multitraume- fysioterapi kartlegging, AFR](#)

[Multitraume- tverrfaglig tiltak, AFR](#)