

## SVK - Stell av SVK tre uker etter innleggelse, BUA, Barne- og ungdomsposten SSK og SSA

Side 1 av 2

 Dokument ID:  
**1.4.3.3.1-11**

 Godkjent dato:  
**18.01.2024**

 Gyldig til:  
**18.01.2026**

 Revisjon:  
**1.12**

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Blod/Sentrale katetere

### 1.0 Hensikt

Sikre faglig forsvarlig stell av SVK innstikksted, unngå å smitte pasienten og oppdage tegn på infeksjon tidlig og eventuelt starte rask behandling.

### 2.0 Omfang

Prosedyren gjelder for lege- og sykepleietjenesten på Barne- og ungdomsposten SSK og SSA.

### 3.0 Ansvar

Avdelingssjef har overordnet ansvar for implementering og revidering av prosedyren, samt at prosedyren blir fulgt. Sykepleiere ved seksjonen har personlig ansvar for å følge prosedyren.

### 4.0 Handling


Utføres av	Oppgaver
Sykepleier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steller tørt innstikksted x 1 pr. uke</li> <li>• Inspiserer/palperer innstikkstedet daglig, med tanke på rødhet, hevelse, ømhet, sekresjon/blødning og hematom</li> <li>• Denne teknikken læres til foreldre som skal utføre stell hjemme, da ikke med sterile hansker/ munnbind</li> </ul>
Sykepleier	<p><b>Utstyr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Usterile hansker                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Men sterile hansker hos allogen stamcelletranplantert og HMAS pasienter til hvite over 1,0</li> <li>• Og munnbind hos allogen stamcelletranplantert og HMAS pasienter til hvite over 1,0</li> </ul> </li> <li>○ sterile kompresser 5 x 5 cm</li> <li>○ eventuelt sterile kompress 10 x 10 cm</li> <li>○ Klorhexidin 1 mg/ml</li> <li>○ Klorhexidin 5 mg/ml</li> <li>○ steristrips</li> <li>○ Opsite / Tegaderm / Mepore ("vindu")</li> <li>○ eventuelt utstyr til bactprøve (Stuarts medium)</li> </ul>
Sykepleier	<p><b>Gjennomføring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informerer/avtaler tidspunkt med pasienten/pårørende</li> <li>• Finner frem utstyr</li> <li>• Eventuelt tar på munnbind</li> <li>• Utfører håndhygiene</li> <li>• Dekker opp sterilt</li> <li>• Fukter sterile kompresser med Klorhexidin 1mg/ml og 1 kompress med 5 mg/ml Klorhexidin</li> <li>• Tar av gammelt "vindu" og steristrips</li> <li>• Utfører håndhygiene</li> <li>• Inspiserer innstikkstedet og vurdere prøvetakning</li> </ul>

 Utarbeidet av:  
**Arbeidsgruppe ved Rikshospitalet:  
 A. C Mørk, E. Selmer, L. Korsvold,  
 M. Sandlie**

 Fagansvarlig:  
**Sunniva Fegran**

 Godkjent av:  
**Avd.leder Kåre Danielsen**

□

		<b>SVK - Stell av SVK tre uker etter innleggelse, BUA, Barne- og ungdomsposten SSK og SSA</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: I.4.3.3.1-11	Utarbeidet av: Arbeidsgruppe ved Rikshospitalet: A. C Mørk, E. Selmer, L. Korsvold, M. Sandlie	Fagansvarlig: Sunniva Fegran	Godkjent dato: 18.01.2024	Godkjent av: Avd.leder Kåre Danielsen	Revisjon: 1.12

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Blod/Sentrale katetere

- Eventuelt tar på sterile hansker
- Tar eventuelt bact.prøver
- Løfter kateteret for å komme til ved innstikksted. Unngår å dra i kateteret
- Desinfiserer innstikkstedet i en radius på 5- 6 cm med fuktet kompress med Klorhexidin 1 mg/ml. Vasker fra innstikkstedet og utover med en spiralbevegelse, gjenta til området er rent
- Lufttørkes
- Desinfiserer kateterslangen fra innstikksted og utover med kompress med Klorhexidin 5 mg/ml. Unngår drag i slangen
- Lufttørkes
- Kateteret legges i en løkke, varier vinkelen på den fra gang til gang
- Fester løkken med steristrips
- Ved sekresjon, legg tørr steril kompress rundt innstikksted
- Setter på ”vindu”
- Dokumenterer stell, observasjoner og evt. prøvetakning

#### Kryssreferanser

[I.4.3.3.1-4](#)

[SVK - Håndtering av komplikasjoner ved innleggelse og bruk av SVK, BUA, Barne- og ungdomspost SSK og SSA](#)

[I.4.3.3.1-10](#)

[SVK - Stell av SVK de første tre ukene etter innleggelse, BUA, Barne- og ungdomsposten SSK og SSA](#)

#### Eksterne referanser