

Fjernelse av hudtumor/nævus/lipomer/atheromer

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOF.KIF.KP.2-3

Godkjent dato:

17.09.2024

Gyldig til:

17.09.2026

Revisjon:

9.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Kirurgisk poliklinikk/Pasienter og brukere

Leie: Avhenger av hvor fjernelsen skal skje.

Barbering: Dersom nødvendig og mulig skal det barberes et område med ca 3 cm utenfor snittet. Dette vurderes ved for eksempel fjernelse i hodebunnen.

Huddesinfeksjon: Desinfiseres om mulig med Klorhexidin 5mg/ml spritoppløsning uten farge på et felt med diameter 10 – 15 cm med fjernelsen sentralt i feltet. På fjernelser i ansiktet brukes en Klorhexidin 0,5 mg/ml

Dekking: Dekkes med sterilt hullstykke.

Snitt: Avhenger av hvor fjernelsen skjer.

Instrumenter: Skadepakke. Evt. Allis tang og små selvholdende haker.

Sterilt utstyr : Lite hullstykke

5 – 10 ml sprøyte, opptrekkskanyle og blå eller orange kanyle.

Sutur etter legens ønske

Knivblad nr 15 eller 11

5 store Tupfer steril

5 små Tupfer steril

2x2 sterile Kompresser 10x10

Xylocain 10 mg/ml med adrenalin (Lidocain 10mg til fingre og tær)

Sterile hansker til operatør

Bandasje materiell

Annet utstyr: Barberingsutstyr

Usterile hansker

Klorhexidin 5 mg /ml med eller uten farge til huddesinfeksjon, evt. Klorhexidin 0,5 mg/ml

Beholder med formaldehyd 4% til prøveforsendelse

Informasjonslapp til pasienten

Fremgangsmåte: Det er ulike årsaker til at fjernelse av hudforandringer blir utført. Det kan være smerter, ubehag, kosmetiske grunner, mistanke om malignitet eller utvidet fjernelse ved bekreftet malignitet.

Ved fjernelse av nævus der det er mistanke om malignitet eller ved re-eksisjoner etter bekreftet malignitet blir bestandig preparatet sendt til histologisk undersøkelse. Ellers vurderes dette av kirurgen i hvert enkelt tilfelle.

Sykepleieoppgaver:

- Åpne skadepakke og annet sterilt utstyr og dekke opp sterilt
- Ta inn pasienten og informere om hva som skal gjøres
- Legge pasienten på undersøkelsesbenken
- Evt. barbere dersom det er nødvendig
- Desinfisere huden
- Finne frem beholder med formaldehyd 4%, merket med pas. navnelapp og kir. pol.
- Legge frem sterile hansker
- Hold Xylocain for kirurgen
- Assister etter legens ønske under inngrepet, for eksempel klippe suturer
- Ta preparatet på formalinglass
- Vaske og bandasjer
- Gi bandasjer og informasjon om bandasjeskift og suturfjerning til pas. + info om Marevanbruk

Utarbeidet av:


Bente Hinderaker

Fagansvarlig:

Bente Hinderaker

Godkjent av:

Petra Kathrin Ruff

 SØRLANDET SYKEHUS	Fjernelse av hudtumor/nævus/lipomer/atheromer				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOF.KIF.KP.2-3	Utarbeidet av: Bente Hinderaker	Fagansvarlig: Bente Hinderaker	Godkjent dato: 17.09.2024	Godkjent av: Petra Kathrin Ruff	Revisjon: 9.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Kirurgisk poliklinikk/Pasienter og brukere

- Rydde og vaske instrumenter og klargjøre rommet

Kryssreferan

Eksterne referanser