

		PASIENTER OG BRUKERE		Generelt dokument
KAROPERERTE PASIENTER - OVERVÅKING AV UNDEREKSTREMITETER (BYPASS, PTA, M.M.)				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-9	Gruppe: []	Godkjent dato: 13.02.2024	Gyldig til: 13.02.2026	Revisjon: 7.11

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Omfang:

Alle karopererte pasienter skal overvåkes nøye i forhold til sirkulasjonen i underekstremitetene. Dette med tanke på evt. trombose og blødning etter karoperasjonen. Dette innebærer følgende observasjon:

LAB: Kontroll APTT 30 min. etter ankomst på PO. Dersom **APTT er mindre enn 50** gis **40mg Klexane s.c.** med en gang (og ikke til kvelden), dersom ikke annet er avtalt. Dersom **APTT er større enn 50** gis **40mg Klexane s.c. til kvelden** (ikke nødvendig med en ekstra kontroll av APTT). NB: Ikke gi Klexane ved pågående blødning eller til koagulopatisk pasient.

ASA 75 mg gis så fort pas. får enteral ernæring.

Første fire timer postoperativt:

- Puls i lysker og i begge fotarterier (ADP og ATP) kontrolleres ved ankomst, og 1 gang i timen de første 4 timene.
 - ADP=arteria dorsalis pedis, på forfoten
 - ATP=arteria tibialis posterior, innside fot, rett bak malleolen
- Dersom det ikke er følbart puls kontrolleres det med håndholdt doppler.

Deretter kontrolleres det på samme vis, 2. hver time, resten av døgnet.

Ønskelig systolisk blodtrykksgrense < 130-140

Dokumenter observasjonene i Metavisionkurven under «registrering-sirkulasjon.» Man kan bruke kommentarfeltet for å spesifisere ADP/ATP pluss/minus. Lyskepuls dokumenteres under «puls annen»-Bruk kommentarfeltet for å spesifisere hø/ve side.

Ved kalde cyanotiske føtter eller ved plutselig bortfall av puls, kontakt vakthavende assistentlege/karkirurg ved kirurgisk avdeling umiddelbart. Vakthavende anestesilege skal også kontaktes og orienteres når man kontakter kirurg. Dokumenter dette i MV og i DIPS.

Hvis pasienten i tillegg har vært til behandling på angiolab skal man sjekke lysken:

- Hvert kvarter første time.
- Hver time de neste 4 timene.
- Deretter to gang per vakt

Dokumenter i MV under «Registrer», «sår» og hø.klikk: «legg til kommentar»

Kryssreferanser

- <http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok26183.pdf> (AAA)

Utarbeidet av: Int.spl. Frode Kleveland	Først utgitt: 16.11.2011	Fagansvarlig: Kir.sekjonsoverlege Erik M. Pettersen og Int.seksjonsoverlege Ole Georg Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	[]
---	------------------------------------	---	--	----

