

		Fagspesifikke prosedyrer		Generelt dokument	
Preoperativ sykepleie på post, ortogeriatriske pasienter med hoftebrudd. - Kirurgiske senger				Side 1 av 2	
Dokument ID: I.4.FEL.2.1-15		Godkjent dato: 22.02.2023	Gyldig til: 22.02.2025	Revisjon: 3.10	

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Ortopedi/Ortogeriatri

Preoperativt mottak i post

Pasienten/pårørende skal tas imot straks, og ikke ligge alene i gangen og vente på mottak. Pasienten føres primært til sitt rom eller annet skjermet sted hvor innkomstintervju tas og informasjon gis. Dele ut [informasjonsbrosjyre](#).

- Generell preoperativ sykepleie.
- Det tilstrebes at det gjennomføres primærsykepleie.
- NEWS føres inn i MetaVision, finnes under fanen Enkel registrering, og så velger du Registrering voksen NEWS.
- Vekt og høyde registreres ved innkomst, eller så snart som mulig
- Skjemaet «Trygg pleie risikovurdering» skal gjøres på alle pasienter. Opprett behandlingsplan.
- Delirforebygging.
 - Medikamentelt (se også [STOPP](#), screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre),
 - skjerming,
 - følge blodprøver som infeksjonsparametre/elektrolytter, Hb osv, jfr prosedyre EKweb.
 - Normalisere omgivelsene.
 - Husk høreapparat og briller
 - Følge opp smertelindring, væskebehandling og O2 behandling. Se også prosedyre på EKweb som omhandler [forebygging av delir](#) spesielt punkt 2.
 - Obs urinretensjon
- Samtlige pasienter som har falt fra egen høyde og pådradd seg et hoftebrudd, blir spurt om de vil være med i et studie om delir på 2C, SSA. Mere informasjon om dette finnes på gode plansjer på ortogeriatrisk vaktrom 2c, SSA.
- 4AT registreres i MetaVision, denne finner du under fanen Registrering og så velger du fanen Skåringer og dernest 4AT. Dette gjentas ved behov under oppholdet.
Se også EK-prosedyre [Akutt forvirring \(delir/konfusjon\)](#)
- Gi [Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly \(IQCODE\)](#) screening intervju skjema til pårørende for utfylling, dersom disse er hos pasienten. Gjøres ellers så snart som mulig i forløpet.(lenke)
- Faste så kort tid som mulig. Som hovedregel skal fastetiden ved inntak av klare væsker være minst 2 timer, ved inntak av annet skal fastetiden være minimum 6 timer. Anestesilege kan bestemme pragmatiske løsninger etter en totalvurdering. Gi næringsrik drikke inn mot starten av fastetiden. Se også Ek prosedyre [Faste før anestesi/operasjon](#)
- Klargjøring etter gjeldende Ek-prosedyre [Kontrollskjema til operasjon](#) ligger i dips.
- På dagtid utenom helg undersøkes pasienten av geriater preoperativt.
- Blærescannet hoftebruddspasienter preoperativt
- Kontakt med kommunehelsetjenesten så raskt som mulig jamfør [samhandlingsreformen](#).

Eksterne referanser

- Svenningsen.S og Lyngstad.K.A . [Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd](#), Ortogeriatrisk enhet, Sørlandet sykehus HF Arendal, 2011
- Østensvik, E. (2008). *Sykepleieboken 3*, kap 13. (1.utgave),Oslo: Akribe AS.

Utarbeidet av: prosjektgruppe v/ Linda S. Johansson	Fagansvarlig: Nina Roland	Godkjent av: Mette Dobler Hamre	
---	-------------------------------------	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Preoperativ sykepleie på post, ortogeriatriske pasienter med hoftebrudd				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.4.FEL.2.1-15	Utarbeidet av: prosjektgruppe v/ Linda S. Johansson	Fagansvarlig: Nina Roland	Godkjent dato: 22.02.2023	Godkjent av: Mette Dobler Hamre	Revisjon: 3.10

Fagspesifikke prosedyrer/Fellesdokumenter kirurgiske /somatiske senger/Ortopedi/Ortogeriatr

- Kirkevold, M. m flere. (2008) *Geriatrisk sykepleie* (1.utgave). Oslo: Gyldendal

[I.3.13-39](#)

[I.4.FEL.2.1-13](#)

[I.4.FEL.2.1-19](#)

[I.4.FEL.2.1-20](#)

[I.4.FEL.2.1-21](#)

[I.4.FEL.2.1-34](#)

[I.5.1.1-7](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-25](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-2](#)

[II.SOK.KSK.3C.2..5-3](#)

[Bruk av NEWS 2 ved SSHF](#)

[Registreringsskjema hoftebrudd](#)

[Confusion assessment method, CAM](#)

[Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly \(IQCODE\)](#)

[STOPP - Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre](#)

[Barthel index \(BI\)](#)

[Ortogeriatr - Pasientinformasjon SSHF](#)

[Femoralisblokkade, Anestesi SSK](#)

[Faste før anestesi/operasjon -voksne SSK](#)

[Screening av trykksår - skjema Kirurgiske Senger SSK, post 3C](#)