

Vippetest/TILT-test, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.4-9

Godkjent dato:

06.03.2023

Revideres innen:

06.03.2025

Sist endret:

06.03.2023

Versjon:

5.00

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Videreføres uten endringer.

Formålet med undersøkelsen:

Synkopeutredning når andre tester ikke har kunnet gi svar.

Forberedelser:

Faste 2 timer.

Utstyr:

- Vippeseng (Lånes fra fysioterapiavdelingen)
- Scopdelen av AKG-apparatet.
- Digitalt BT-apparat.
- Manuelt BT-apparat tilgjengelig. (Ved BT-fall kan elektronisk apparat ha problemer med å måle).
- Nitroglycerinspray
- Skjema for registrering av BT og puls.
- Både lege og sykepleier skal være tilstede under testen.

Gjennomføring av undersøkelsen:

- Legge pasient på vippeseng, med føttene mot fotbrettet.
- Feste EKG-ledninger og ta EKG.
- Feste BT-apparat og ta BT.
- Fest belter over kne- og hoftledd, og over brystet.
- La pasienten ligge i til sammen 10 minutter før en starter testen. Dempet belysning og ro i rommet.
- Heve senga til 80 grader i 10 minutter.
- Notere puls hvert minutt og BT hvert andre minutt, pluss ved symptomer.
- Ved symptomer som stort BT-fall, bradykardi, nærsyncope eller syncope senkes senga umiddelbart.
- Etter 10 minutter legges senga ned, pasienten får Nitroglycerinspray før senga heves i nye 10 minutter.
- BT registreres hvert andre minutt, og puls hvert minutt som i første runde.
- Ingen symptomer og testen er negativ.
- Positiv test ved: syncope, nærsyncope + BT fall > 30 mmHg eller systolisk BT <70 og eller uttalt bradycardi >30 slag pulsreduksjon.

Kryssreferanser**Eksterne referanser**

Utarbeidet av: Lena Eriksen Skjelnes/Hjertepol	Fagansvarlig: Karen-Margrethe Ziesler Krogstrud/Thomas Dahlslett	Verifisert av: []	Godkjent av: Nina Roland	Dok.nr: D30449
---	--	----------------------	-----------------------------	-------------------