

Benholderleie til TLH/LSH. Opr SSK

 Dokument ID:
II.SOK.AIO.SSK.11.2-7

 Godkjent dato:
04.11.2021

 Gyldig til:
04.11.2024

 Revisjon:
6.02

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Leiringsprosedyrer/Gyn, urologi

Leiringsutstyr	Leiring/Trykkavlastning
Armstøtte x2	Armene langs siden med håndflaten mot pasienten. Sidestøtter til armene begge sider. Ledninger og koblinger som kan skape trykk pakkes inn. Hånden bygges opp for å unngå drop. Pasienten skal ha skjorten bak frem for å sikre mest mulig bar hud mot pinkpad madrassen. Bena bør legges i benholdere samtidig for å unngå torsjon lumbalt. Setet 3 cm utenfor kanten for god tilgang. Unngå hyperabduksjon av hofteleddene. Vinkel på benholdere reguleres for å unngå strekk og max 90°.
Benholdere	
Grønne puter	
Antiskli x2	
Pinkpad	
Strømper	
Gjør klart bordet med benholdere og pinkpad på forhånd. Antiskli under puten på hodeenden og under hodeputen, pinkpad over hodeputen. Hodedel skal være påmontert og lett hevet. Løftelaken brettes smalt og plasseres under pasientens korsrygg. Trykkavlastende stillingsendring 10 min hver 2 timer.	

Illustrasjon


 Utarbeidet av:
Jorunn Buer, Daniel Drifell, Fredrik Jensen, Aase Mette Kjenes, Knud Knudsen, Erik Sæther

 Fagansvarlig:
Aase Mette Kjenes

 Godkjent av:
Kristin Engenes Knudsen

Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.11.2-7	Utarbeidet av: Jorunn Buer, Daniel Drifell, Fredrik Jensen, Aase Mette Kjenes, Knud Knudsen, Erik Sæther	Fagansvarlig: Aase Mette Kjenes	Godkjent dato: 04.11.2021	Godkjent av: Kristin Engenes Knudsen	Revisjon: 6.02
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	---	-------------------

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Leiringsprosedyrer/Gyn, urologi

Utsatte nerver	Trykkpunkter
N. Brachialis	Sacrum
N. Ulnaris	Calcaneus
N. Ischiadicus	Ryggraden/Korsryggen
N. Peroneus	Scapula
N. Femoralis	Olecranon
	Occiput
	Lateralt kne/Legg