

Chlamydia trachomatis - Prosedyre SSHF

Side 1 av 2

Dokument ID:
1.4.8.5-2Godkjent dato:
20.06.2024Gyldig til:
20.06.2026Revisjon:
9.00

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi\Prosedyrer Gynekologi

Omfang

Prosedyren omhandler pasienter som har fått påvist Chlamydia trachomatis. Diagnosen gir rett til gratis antibiotikabehandling. "Blå resept", Smittevernloven § 4

Hensikt

Sikre at pasienter med Chlamydia trachomatis får forsvarlig og god behandling.

Ansvar


Enhetsleder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Lege, sykepleier og hjelpepleier har ansvar for å følge prosedyren.

Koding

A56.0 Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem

UTREDNING, OBSERVASJON OG BEHANDLING	
Symptomer	<ul style="list-style-type: none"> 70- 95% er asymptomatiske Dysuri, endret utflod, utflod fra urethra, endocervicale ulcerer, dyspareuni, postcoital blødning, intermenstruell blødning, abdominale smerter
Hvem testes?	<ul style="list-style-type: none"> Risikofaktor for infeksjon; Alder<25, ny seksualkontakt siste året, mer enn en partner siste året. Smittekontakter Ved symptomer Ved av prov Ved innsetting av spiral
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> 14 dagers inkubasjonstid, kan ikke stole på negativ test om den er tatt før. Oftest blir den positiv etter noen dager, men ved negativ test bør man evt ta ny test om 1-2 uker. Baktus fra cervix og vagina. Bruk: <i>Cobas PCR female swab (gul kork)</i> (samme pinne for Chlamydia, Mycoplasma og gonore`.) Prøven kan tas av kvinnen selv, dette er vist til å ha vel så bra sensitivitet.
Behandling	<ul style="list-style-type: none"> <i>Doxycyklin 200 mg x 1 p.o i 7 dager (evidens nivå A). Obs soleksponering</i> <i>Azitromycin 1 g p.o engangsdose ved negativ mycoplasmatest (evidensnivå A). (Førstevalg ved sydenferie eller ved for eks. problemer med complaiance)</i> <i>Ved påvist mycoplasma koinfeksjon: Azitromycin 5 dagers kur: 500mg første dag, deretter 250mg x 2 i 4 dager</i> <u>Gravid pasient:</u> Azitromycin 1 g p.o engangsdose (1a)(bør vente til etter uke 12). Amoxicillin 500mg x 3 i 7 dager (1a) Positivt svar ved test i forbindelse med provosert abort eller ved innsetting av spiral: Se generelt (over). Behandling initieres snarest mulig.
Oppfølging	<ul style="list-style-type: none"> Laboratoriene melder anonymt. Smitteoppsporing (inntil 6 mnd tilbake i tid) pålagt. Partner undersøkes og behandles gratis hos fastlegen. Sikkert smitteeksponerte behandles selv om de er dyrkingsnegative.

Utarbeidet av:
Anne-Liv Rosen SzirakiFagansvarlig:
Ingvild Vistad/ Eberhard
Ruff/Jeanne Mette
Goderstad/Jeanne Mette
GoderstadGodkjent av:
Ingvild Vistad

 SØRLANDET SYKEHUS		Chlamydia trachomatis - Prosedyre SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.4.8.5-2	Utarbeidet av: Anne-Liv Rosen Sziraki	Fagansvarlig: Ingvild Vistad/ Eberhard Ruff/Jeanne Mette Goderstad	Godkjent dato: 20.06.2024	Godkjent av: Ingvild Vistad	Revisjon: 9.00

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi\Prosedyrer Gynekologi

	<ul style="list-style-type: none"> • Avholdenhet fra samleie i 7 dager fra behandlingsstart • Kontrollprøve; tidligst fem uker etter behandling. Indisert ved: graviditet, persisterende symptomer eller ved behandling med erythromycin/amoxicillin. Pas. bestiller selv time hos fastlegen. Øvrige pasienter gjøres oppmerksomme på muligheten for kontroll og kan om ønskelig bestille kontroll hos fastlegen. • Pasientinformasjon: Chlamydia trachomatis - Pasientinformasjon SSHF
--	--

Kryssreferanser

[I.4.8.5-3](#)

[Bekkeninfeksjon/PID - Prosedyre SSHF](#)

[I.5.3.6-2](#)

[Chlamydia trachomatis - Pasientinformasjon SSHF](#)

Eksterne referanser

[9.11 Veileder i generell gynekologi 2009](#)

[9.8 Legemiddelhåndboka](#)

[9.19 Treatment of Chlamydia trachomatis infection](#)

[9.20 2006 UK National Guideline for the Management of Genital Tract Infection with Chlamydia trachomatis](#)

[22 Folkehelseinstituttet](#)

[23 Olafiaklinikken](#)