

PICC-line - indikasjon for innleggelseDokument ID:
I.3.13-11Godkjent dato:
26.02.2024Gyldig til:
26.02.2026Revisjon:
1.05

Generelle fagprosedyrer/Andre tverrgående prosedyrer/retningslinjer

Målgruppe:

Pasienter som trenger sentralvenøs tilgang

Hensikt:

Sikre at pasienten får riktig intravenøs tilgang

Ansvar:

- Behandlende lege henviser til anestesivdelingen via DIPS. Anestesilege kontaktes i tillegg dersom det haster.
- PICC-lineteam legger kateter etter indikasjon er godkjent av anestesilege

Indikasjon:

- Langvarig behov (utover 1-2 uker) for i.v tilgang (eks: langvarig antibiotika behandling)
- Hjemmebehandling med i.v.
- Parenteral ernæring
- Særlig vevsirriterende medikamenter (eks: cytostatica, cordarone, vancomycin)
- Ved kontraindikasjon for standard SVK (eks: antikoagulasjon og redusert lungefunksjon)
- Særlig utfordrende PVK (veneflon) innleggelse
- Blodprøvetakning i spesielle tilfeller (eks: utfordrende å stikke, hyppige blodprøver, angst for stikk)

Relative kontraindikasjoner:

- Ikke egnet pasient
- Lokal infeksjon eller trombose i arm
- Lymfødem (eks pga axilletoilette)
- Særlig trombosen tilstand
- Alvorlig koagulopati
- Allergi mot katetermateriale

Annen informasjon:

PICC-line innleggelse utføres fortrinnsvis på operasjonsstuen. Kateteret innlegges ultralydveiledet under sterile forhold. Etter utført prosedyre tas røntgenkontroll.