

## Oppfølging av Barnet

Spesialisthelsetjenesten skal:

Telefonkontakt mellom sykepleier i ressursgruppe og pårørende og evt. barnet etter 2 uker ved:

- Oppstart av behandling
- Utprøving av ny maske
- Utprøving av nytt CPAP/BiLevel apparat
- Forandringer i innstillinger

Poliklinisk kontroll 3-4 måneder etter oppstart av behandling

Poliklinisk kontroll x 1 pr år

- Prøve å koordinere med andre kontroller/avtaler på sykehuset- Se F7

Innleggelse x 1 pr år

- Nattlige målinger

Barn og ungdom med stabil sykehistorie kontrolleres 2 ganger i året, en poliklinisk og en innleggelse. Barn og ungdom med progressive sykdommer må vurderes til hyppigere kontroller (Opp til 4 kontroller- poliklinisk eller innleggelse).

Kontroller bør innbefatte:

- Klinisk undersøkelse
- Nedlasting av data fra ventilator
- Gjennomgang av utstyr og vedlikehold
- Behov for ny maske, tilpasning av maske nr.2
- Kapillær blodgassanalyse (når arteriell?? )
- Pulsoksymetri (hjemme 2 dager? Før kontroll)
- Digitale bilder av ansikt, side og front x 1 pr år
- Bruker med helmaske skal ta røntgen ansiktsskjelett, side og front x 1 pr år
- Ressusiteringsplan - oppdatering

Dette vurderes:

- Røntgen thorax
- Polysomnografi
- EKG og ekkokardiografi
- Spirometri, hostePEF, MIP, MEP
- Endoskopisk undersøkelse av luftveier
- Justering av innstillinger/ventilatormodus
- Henvisning til fysioterapeut, slimmobiliserende tiltak
- Ansiktsforandringer → røntgen ansiktsskjelett, side og front
- Tilsyn av annen spesialist; kardiolog, nevrolog, HABU, evt. andre