

Etter operasjon for skjeling

Navn:

Kontrolltime hos ortoptist ved øyepoliklinikken 1. etg. i Arendal

..... kl.

Bandasjen kan du ta av sent i ettermiddag hvis den irriterer, eller i morgen tidlig.

Etter operasjonen

- Det er vanlig at øyet kan være irritert eller vondt den første tiden, særlig når du ser til sidene. Stingene kan kjøles som rusk.
- Øyet er ofte rødt og litt hovent.
- Vær forsiktig ved dusj/hårvask slik at vann/såpe ikke kommer i øynene.
- Du skal ikke gni øyet de første 2 ukene etter operasjonen.
- Unngå svømmehall/sjøbad de første 4-6 ukene.
- Dobbeltsyn er normalt i noen dager. Hvis du opplever dobbeltsyn må du ikke kjøre bil.
- Barn som bruker lapp kan ta en pause fra lappen til etter kontrolltiden hos ortoptisten.
- Hvis du bruker briller må du fortsette med dem hvis ingen annen informasjon er gitt.

Etter operasjonen drypper du det opererte øyet med


- Spersadex m/Kloramfenikol 4 ganger daglig i 2 uker
- Kloramfenikol salve 1-3 ganger daglig, mest for å unngå irritasjon av stingene. Stingene vil forsvinne etter ca. 14 dager
- Smertestillende tabletter inntil 3 ganger daglig

Kontakt

Hvis du får veldig vondt eller det oppstår problemer etter operasjonen, kan du kontakte:

Øyepoliklinikken Arendal tlf 37 01 49 05 (man-fre 08-15)

Øyeavdelingen Arendal tlf 37 01 47 20 utenom kontortid



trygghet når du trenger det mest