

Mottak av respiratorisk dårlig barn med CPAP/BiLevel

Utstyr:

- Har barnet med sitt eget utstyr?
 - CPAP eller BiLevelmaskin og maske
 - Hvis maskinen og maske er glemt hjemme, må foreldrene hente denne hvis det ikke er veldig lang reisevei. Barnesenteret har ingen egen maskin som kan brukes.
 - Lungeposten har noen maskiner som man kan spørre om å låne. Det kan være man får låne en annen maskin enn det barnet er vant til å bruke
 - Barneposten har noen masker liggende i skap på gamle sengevasken som kan brukes til barnet får tilbake sin egen eller hvis barnet skal ha helmaske
 - Pulsoksymeter
 - Inhalasjonsapparat
- Sug + sugekateter på rommet
- Oksygentilkobling med grønn O2-slange og mellomstykke til slangekretsen
- Sterilt vann til fukter
- Avdelingens AeroNeb Pro inhalasjonsapparat vurderes hvis barnet ikke har eget
 - På Barneposten ligger apparatet i skap på gamle sengevask

Hva gjør man?

- Hevet hodeende
- Åpne luftveier
 - Sug nese
 - Bruk nesedråper
- Inhalasjoner etter legens forordning
- Fysioterapi etter legens henvisning
- Vurdere å skru opp trykk på maskinen
- Vurdere behov for helmaske i stedet for nesemaske
 - Barn skal ikke være alene ved bruk av helmaske på grunn av fare for aspirasjon ved evt oppkast
 - Husk å sjekke om det er ekspirasjonsventil på helmasken før barnet begynner å bruke den
- Vurdere oftere syre/base kontroller etter legens forordning
- Vurdere transcutan måler
- Husk å PEVSE
 - Viktig å tenke på at barn med respirasjonsproblematikk kan ha økt respirasjonsfrekvens og puls som normalverdi
 - Barnet skal kun ha ”ekstrapoeng” for bruk av CPAP/BiLevel hvis det er økt bruk eller økte trykk i forhold til det som er normalt
- CPAP/BiLevel kan også brukes når barnet er våkent. Når barnet er respiratorisk dårlig, er det viktig at barnet bruker det mer enn til vanlig.