

			Generelt dokument
Antikoagulasjonsbehandling PDT og biopsi, ØNH poliklinikk, SSK			Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.ØNH.SSK.2.a-1	Godkjent dato: 15.06.2023	Gyldig til: 15.06.2025	Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Leger

PDT med lysbehandling og operasjoner på poliklinikken

- **Marevan** - slutte med Marevan 3 dager før behandling inkludert behandlingsdagen.
- **Pradaxa** - slutter med medikamentet 24 timer før inngrep og begynner igjen 12 timer etter inngrep.
 Dette gjelder kun ved:
 - lappeplastikk
 - fritt hudtransplantat
 - bihulekirurgi
 - conchotomi
 - PDT på BCC (der pasienten kommer 2 ganger)
- **INR** tas samme dag som behandling
- **Vanlige medisiner** tas, hvis ikke annet er avtalt
- **Acetylsalisyholdige medisiner** (albyl, globoid, dispril, plavix) – pasienten skal slutte med disse en uke før behandling.

PDT med dagslysbehandling – ingen forhåndsregler , ingen medisineseponering

- Ingen forhåndsregler, ingen medisineseponering

Biopsi

- ingen forhåndsregler, ingen medisineseponering

(Ved operasjon på sentral operasjonsstue følges retningslinjen ” Antikoagulasjon og kirurgi”)

Eksterne referanser

[I.3.13-1](#)

[Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)

Utarbeidet av: Liv Henny Kyllingstad	Fagansvarlig: Beate Phillipson	Godkjent av: Jorunn Sandvik	
--	--	---------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Antikoagulasjonsbehandling PDT og biopsi, ØNH poliklinikk, SSK				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSK.2.a-1	Utarbeidet av: Liv Henny Kyllingstad	Fagansvarlig: Beate Phillipson	Godkjent dato: 15.06.2023	Godkjent av: Jorunn Sandvik	Revisjon: 4.00

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Leger