

		Fagspesifikke prosedyrer		Generelt dokument
Diabetes behandlingslinje - Veiledning til foreskrivning av resepter ved nyoppdaget diabetes, Barne- og ungdomsavdelingen SSHF				Side 1 av 1
Dokument ID: 1.4.3.4.1-45	Godkjent dato: 27.09.2021	Gyldig til: 27.09.2023	Revisjon: 0.02	

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Endokrinologi med diabetes/DIA - Behandlingslinje Nyoppdaget diabetes

HENSIKT

Prosedyren er en veiledning til foreskrivning av aktuelle resepter ved utskrivelse av barn/ungdom som er innlagt med nyoppdaget Diabetes i Barne- og ungdomsavdelingen

MÅLGRUPPE

Leger og sykepleiere som har ansvar for pasienter med Diabetes

FREM GANGSMÅTE

Foreskrivning av resept

Følgende utstyr er et eksempel på utstyr som vanligvis alle barn og unge med nyoppdaget Diabetes trenger ved utskrivelse. Eksempel på resept til pasient som skrives ut med insulinpumpe:

1. Rp. Novorapid hetteglass 10 ml. Antall: Anslå antall etter antatt insulinbehov pr 3 måneder.
2. Rp. Novorapid Flexpen 3 ml x 5. Antall: 1 pakke er vanligvis nok.
 - ✓ Dersom det er behov for halve enheter med insulin, skal man skrive ut Novopen Echo (på handelsvarer i bruk) samt resept på Novorapid penfill
 - ✓ Rp. Novorapid penfill 3 ml x 5. Antall: 1 pakke er vanligvis nok.
3. Rp. Lantus Solostar (ferdigfylt penn) 3 ml x 5. Antall: 1 pakke er nok.
Skriv på resepten: Langsomtvirkende insulin som skal settes en gang pr døgn omtrent til samme tid, erstatter basal dose i pumpa: angi antatt startdose
4. Rp. Glucagon engangssett. Antall: 1-3. Dosering 0,5 mg ved vekt < 25 kg, 1 mg > 25 kg kroppsvekt. Settes i låret ved alvorlig føling.

Til pasienter som skrives ut med multi-injeksjonsregime byttes Novorapid hetteglass med Novorapid penfill, de fleste bruker da ordinære insulinpenn, ikke flexpen som er engangspenn (ferdigfylt), Lantus (evt annet langsomtvirkende insulin) skrives også ut som penfill.

NB: Husk å reitere x 3, slik at resepten fungerer det neste kalenderåret

Bestilling av forbruksmateriell

Alt annet (forbruks-) utstyr står under handelsvarer i bruk, det er eget punkt for pasienter med diabetes. Antall blodsukkerstiks pr dag må anslås. Skriv i det nederste feltet at pasienten trenger følgende:

Lansetter, kanyler til penn (Novofine 6 mm), ketostix, stiks til måling av blodsukker og evt insulinpenn

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Prosjektgruppe	Fagansvarlig: Jorunn Ulriksen	Godkjent av: <ikke styrt>	
---	---	---	--