

Etter operasjon med kontaktlinse inn i øyet, ICL

HØ / VE øye

Navn _____ Født _____

Kontrolltime hos dr. _____

Kontrolltime hos dr. _____

Øyeskjoldet skal brukes om natten i en uke.

Det opererte øye skal dryppes med:

Spersadex m/Kloramfenikol og Voltaren øyedråper 3 ganger daglig i ca 4 uker, også på operasjonsdagen.

La det gå ca 5 min mellom hver dråpe.

PASS PÅ AT DU FORTSETTER Å BRUKE DINE VANLIGE ØYEDRÅPER!

UNNGÅ Å GNI DEG I DET OPERERTE ØYET, dette er spesielt viktig den første uken.

Ellers kan du leve normalt: være ute, lese, se TV.

Ikke dusj /sprut vann i ansiktet når du vasker deg første uken.


Litt svie/ruskfølelse i øyet er normalt. Det hender også at øyet er litt rødt.

Ta kontakt ved

- Raskt redusert syn
- Økende ømhet/smerte i øyet
- Økende lysskyhet
- Økende rødme i det opererte øyet

Øyepoliklinikken Arendal tlf 37 01 49 05 (man-fre 08-15)

Øyeavdelingen Arendal tlf 37 01 47 20 utenom kontortid



trygghet når du trenger det mest