

**Pasientinformasjon for inneliggende pasienter - gastroskopi med sengepost SSF**

Side 1 av 1

Dokument ID:

**II.SOF.MEF.M-F.1.2.1-14**

Godkjent dato:

**26.09.2017**

Gyldig til:

**26.09.2019**

Revisjon:

**2.00**

Somatikk Flekkefjord/Medisinsk avdeling SSF/Medisin SSF/Pasienter og brukere/Med sengepost Pasient og brukere SSF

## Gastroskopi – undersøkelse av magen

Gastroskopi er en undersøkelse som utføres for å se på slimhinnen i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen.

Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en bøyeleg slange, forsynt med kamera og lys som overfører bilder til en skjerm. Slangen føres ned i spiserøret av legen mens du svelger, og videre ned i magesekken og tolvfingertarmen. Slimhinnene kan dermed inspiseres av lege på dataskjerm.

Du vil i forkant av undersøkelsen få lokalbedøvelse i halsen.

Undersøkelsen tar vanligvis 5 – 10 minutter. Du kan merke litt trykk og ubehag i magen, men det er ikke smertefullt.

Du kan få noe avslappende (sprøyte) før undersøkelsen, da vil du være litt slapp de første 1-2 timer etterpå, og kan heller ikke kjøre bil denne dagen.

### Forberedelse til undersøkelsen:

Du må møte fastende. Det vil si at du ikke må spise eller røyke etter kl. 24.00 kvelden før undersøkelsen – eller senest 6 timer før undersøkelsen. Du kan heller ikke ta medikamenter 6 timer før undersøkelsen, men du kan drikke små mengder klart vann inntil 3 timer før undersøkelsen.

### Etter undersøkelsen:

Har du fått bedøvende spray i munnen, kan du ikke spise eller drikke den første halvtimen etter undersøkelsen.

**Faster fra kl. \_\_\_\_\_**