

Åpen operasjon av lyskebrokk hos barn

Operasjonen utføres i narkose.

Lyskebrokk skyldes en medfødt svakhet i bukveggen i lyskekanalen. Dette kan føre til at bukinnhold presser seg frem gjennom bukveggen og kan sees som en kul når barnet står oppreist, hoster eller presser ut magen. Brokksekken fjernes og sys igjen gjennom et lite snitt i lysken.

Etter operasjonen:

Smerter

Barnet får lokalbedøvelse i såret. Dette demper smertene de første timene etter operasjonen.

Det må forventes noe smerter i operasjonsområdet de første dagene etter operasjonen. Bruk Paracetamol (Paracet) som smertestillende medikament, følg pakningsvedlegget for dosering.

Etter operasjonen vil barnet få en hard, øm hevelse like under operasjonssåret. Dette er normalt, og kan vare i flere uker etter operasjonen. Hos gutter kan det også sive blod ned i kjønnsorganene som gir en blåsort farge. Dette forsvinner etter hvert av seg selv.

Sår/hygiene

Barnet kan dusje 2 dager etter operasjonen. Barnet kan dusje med bandasjen på, la deretter såret lufttørke og legg på ny bandasje.

Bytt bandasje hver gang barnet dusjer dersom den blir våt. Dersom bandasjen er gjennomtrukket med blod før det er gått 2 dager, må den skiftes tidligere. Dekk såret med bandasje til såret er grodd, ca. 2 uker.

Sting

- Såret er sydd med innvendige sting som forsvinner av seg selv etter ca. 2 uker.
- Såret er sydd med sting som kan fjernes hos din fastlege etter 12-14 dager

Dersom såret er stripset, kan disse sitte på til de faller av.

Vannlating

Påse at vannlatingen fungerer som normalt etter operasjonen. Ta kontakt med sykehuset dersom barnet ikke får latt vannet i løpet av kvelden.



trygghet når du trenger det mest

Aktivitet

Barnet bør ta det med ro de første 2-3 dagene etter operasjonen, men normal aktivitet inntil smertegrensen er bra.

Barnet bør, så langt det er mulig, unngå aktivitet som gir høy puls i 2 uker etter operasjonen.

Kontakt sykehuset dersom:

- barnet får symptomer på infeksjon. Symptomer vil være økende smerter, rødhet, varme, hevelse og sekresjon fra såret
- barnet får blødning fra såret som ikke lar seg stoppe ved å utøve et fast trykk over stedet i 10 minutter

Kontakt

Sørlandet sykehus Arendal: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt sykehuset på telefon 906 10 600, spør etter vakthavende kirurg.

Sørlandet sykehus Kristiansand: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt akuttmottak på telefon 38 07 34 21.

Sørlandet sykehus Flekkefjord: Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på tlf 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt 38 32 72 90.

Kontroll (fylles ut operasjonsdagen)

- Det er ikke avtalt kontroll etter operasjonen
- Det er planlagt kontroll om:
Du får time tilsendt i posten.

trygghet når du trenger det mest