

Fiksering av ikke nedsunken testikkel i pungen (orchiopexi)

Operasjonen utføres i narkose.

I utgangspunktet skal testiklene være på plass i pungen før barnet er 1 år. Har den ikke kommet langt nok ned, må den opereres ned i pungen. Hensikten med operasjonen er å forebygge sykdom i testiklene.

Ved operasjonen frigjøres opphenget til testikkelen (blodårer og sædleder) slik at den kan føres ned i pungen. Vanligvis fikses testikkelen til pungen for å forhindre at den vandrer opp igjen.

Etter operasjonen:

Smerter

Det er normalt med lette til moderate smerter etter operasjonen. Paracetamol (Paracet) er vanligvis tilstrekkelig som smertestillende, følg pakningsvedlegget for dosering.

Vannlating

Kontroller at vannlatingen fungerer som normalt etter operasjonen. Ta kontakt med sykehuset dersom barnet ikke får latt vannet i løpet av ettermiddag/kveld.

Sår/hygiene

Barnet får et lite sår på pungen og et lite sår i lysken. Hevelse og bloduttredelse (blåmerke) er vanlig like etter operasjonen.

Bandasjen skal holdes tørr. Skift bandasjen dersom den blir våt eller gjennomtrukket av blod.

Barnet kan dusje 2 dager etter operasjonen. Dusj med bandasjen på, la såret lufttørke og legg på ny bandasje. Bruk bandasje på såret til det er helt tørt og grodd, ca. 14 dager

Barnet bør unngå badekar, offentlig basseng og bading utendørs inntil såret er grodd, ca. 14 dager.


Dersom barnet bruker bleie, må denne byttes oftere enn vanlig.

Sting

Såret er sydd med innvendige sting som forsvinner av seg selv.

Dersom såret er stripset, kan disse sitte på til de faller av.

trygghet når du trenger det mest



Aktivitet

Etter behandlingen kan barnet være i normal aktivitet inntil smertegrensen.

Barnet bør være hjemme fra barnehage/skole i 2 – 5 dager.

Barnet bør unngå fysisk aktivitet som gir høy puls i 2 uker, samt unngå slag mot operasjonsområdet.

Kontakt sykehuset dersom:

- barnet får symptomer på infeksjon. Tegn på infeksjon er rødhet i såret, økende smerter, puss fra såret, feber og evt. frysninger
- pungen blir hoven og hard, noe som kan være et tegn på blødning
- barnet får blødning

Mål barnets temperatur før du kontakter lege/sykehus.

Kontakt

Sørlandet sykehus Arendal: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt sykehuset på telefon 906 10 600, spør etter vakthavende kirurg.

Sørlandet sykehus Kristiansand: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt akuttmottak på telefon 38 07 34 21.

Sørlandet sykehus Flekkefjord: Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på tlf 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt 38 32 72 90.

Kontroll (fylles ut operasjonsdagen)

- Det er ikke avtalt kontroll etter operasjonen
- Det er planlagt kontroll om:
Du får time tilsendt i posten.

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest