

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) er en komplikasjon som kan oppstå etter bruk av hormonsprøyter i forbindelse med kunstig befruktning.

Milde symptomer er hevelser i ben eller armer, vektøkning og følelse av å være oppblåst i magen. Rundt én av ti kvinner får mer alvorlige bivirkninger som kvalme eller oppkast, tungpust og problemer med nyrene eller leveren.

Tilstanden deles inn i tre grader:

- Grad 1: Ubehag i magen, tyngdefornemmelse, kvalme, diarè. Eggstokkene er forstørret opp til 5 cm.
- Grad 2: Magesmerter, kvalme/brekninger, utspilt mage, diarè, væske i magen (acites). Eggstokkene er forstørret opp til 12 cm.
- Grad 3: Væske i magen eller på lungene (pleura). Eggstokkene er større enn 12 cm.

Ved grad 1 trenger du ikke legges inn på sykehus, men skal følges av lege på poliklinikken til du er i bedring.

Ved grad 2 og 3 vil du bli innlagt så vi kan observere deg.

- Det vil bli tatt blodprøver av deg daglig
- Det vil bli gjort ultralyd av deg så hyppig som tilstanden din tilsier.
- Det vil bli aktuelt med røntgen av for eksempel lunger eller EKG av hjertet dersom tilstanden din tilsier det. Ev. andre undersøkelser
- Du vil få en sprøyte i magen som skal forhindre blodpropp.
- Vi vil føre regnskap på hvor mye du drikker og hvor mye du tisser.
- Vi vil måle vekt, omkrets av magen, puls, temperatur, respirasjon (pusterytme) og blodtrykk daglig

Når tilstanden din bedres vil du bli utskrevet fra sengeposten – og eventuelt følges opp poliklinisk.

trygghet når du trenger det mest

