

## Fjerning av testikkel (orchiektomi) hos barn

Operasjonen utføres i narkose.

I utgangspunktet skal testiklene være på plass i pungen før barnet er 1 år. Har den ikke kommet langt nok ned, må den opereres ned i pungen. Hensikten med operasjonen er å forebygge sykdom i testiklene.

I noen få tilfeller kan sædlederen og/ eller blodforsyningen være for kort, slik at det ikke lykkes å få nok lengde på opphenget til testikkelen til at den kan ligge i pungen. Det blir da nødvendig å fjerne testikkelen.

### Etter operasjonen:

#### Smerter

Det er normalt med lette smerter etter operasjonen. Paracetamol er vanligvis tilstrekkelig som smertestillende, følg pakningsvedlegget for dosering.

#### Vannlating

Påse at vannlatingen fungerer som normalt etter operasjonen. Ta kontakt med sykehuset dersom barnet ikke får latt vannet i løpet av ettermiddag/kveld.

#### Sår/hygiene

Barnet får et lite sår i lysken og på pungen. Hevelse og blåmerker er vanlig like etter operasjonen.

Bandasjen holdes ren og tørr. Skift bandasjen dersom den blir våt eller gjennomtrukket av blod.

Barnet kan dusje 2 dager etter operasjonen. Dusj med bandasjen på, la såret lufttørke og legg på ny bandasje. Bruk bandasje på såret til det er helt tørt og grodd, ca. 14 dager.

Barnet bør unngå badekar, offentlig basseng og bading utendørs inntil såret er grodd, ca. 14 dager.

Dersom barnet bruker bleie, bør denne byttes oftere enn vanlig.

#### Sting


Såret er sydd med innvendige sting som forsvinner av seg selv.

Dersom såret er stripset, kan disse sitte på til de faller av.

#### Aktivitet

Etter operasjonen kan barnet være i normal aktivitet inntil smertegrensen.

Barnet bør være hjemme fra barnehage/skole i 2 - 5 dager.



trygghet når du trenger det mest

Barnet bør unngå fysisk aktivitet som gir høy puls de første 14 dagene, samt unngå slag mot operasjonsområdet.

### **Kontakt lege dersom:**

- barnet får symptomer på infeksjon. Tegn på infeksjon er rødhet i såret, økende smerter, puss fra såret, feber over 38 grader over flere dager og evt. frysninger
- dersom det blør fra såret eller dersom bandasjen er gjennomtrukket av blod
- pungen blir hoven og hard, noe som kan være tegn på blødning.
- barnet får problemer med å late vannet

Mål temperaturen på barnet før du kontakter lege/sykehus

### **Kontakt**

**Sørlandet sykehus Arendal:** Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt sykehuset på telefon 906 10 600, spør etter vakthavende kirurg.

**Sørlandet sykehus Kristiansand:** Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, kontakt akuttmottak på telefon 38 07 34 21.

**Sørlandet sykehus Flekkefjord:** Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på tlf 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt 38 32 72 90.

### **Kontroll (fylles ut operasjonsdagen)**

- Det er ikke avtalt kontroll etter operasjonen
- Det er planlagt kontroll om:  
Du får time tilsendt i posten.

trygghet når du trenger det mest