

FESS/ ETHMOIDECTOMI - ØNH, SSA

 Dokument ID:
II.SOK.ØNH.SSA.2.b-6

 Godkjent dato:
26.10.2023

 Gyldig til:
26.10.2025

 Revisjon:
6.04

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Fess = Funksjonell Endoskopisk Sinus Surgery.
 Ved fess lages det større åpninger inn til bihulene.
 Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse med sedasjon.

Rack (Storz) med kamera plasseres ved hodeenden
UTSTYR:

Utstyr fra sterilentralen: Fessinstrument-container

 Utstyr fra lager:
 Nesesett

 Utstyr fra st.13:
 Sett til innleggelse av nesetamponger
 Ev 1 pk. bomullspinner
 kameratrekk
 1 Mini-Spike
 Nesesug med bøyd tupp
 Nesesug med rett tupp
 2 gastamponger (Sterile)
 3 Boller

Utstyr fra lager utenfor st. 13:

 stiv optikk 0 grader, 4 mm
 stiv optikk 30 grader 4 mm (tilgjengelig)
 Mellomstykke til kamera
 grå lysledning
 2 stk. meroceltamponger, lange eller korte, spør legen
 Ev : 2-delt mellomstykke (Steinsvåg) (Rengjøres med 3-trinns system Tristel)


 Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor st.13:
 1 hetteglass Tetracain m./adr.
 1 tube Terra-cortril salve
 1 hetteglass med Xylocain 10 mg./ml.m./adr.
 1 flaske NaCl

LEIE:

”strandstol”/ sittende

PRE-OPR.FORBEREDELSE – LOKALBEDØVELSE:

Bomullspinner fuktes i tetracain m. adr. og settes inn i pas. nese av legen. Deretter får pasienten en gastampong, fuktet med tetracain m./adr. i hvert nesebor.
 Evt. injiseres Xylocain 10 mg./ml. m./adr.

 SØRLANDET SYKEHUS	FESS/ ETHMOIDECTOMI - ØNH, SSA				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-6	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Anders Torp	Godkjent dato: 26.10.2023	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 6.04

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

HUDESINFEKSJON:

ingen vask

DEKKING:

Selvheftende laken med lim under pasientens hake.

I tillegg ved narkose: Øyeplaster. **Operatøren skal kunne se øynene.** Håndkle med lim festes fra overkant av nesen og oppover.

OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:

Scoperer i nesen. Det lages større åpning inn til bihuler.

Legger inn merocel tamponger m./Terra-cortril salve i pas. nesebor ved opr. slutt. Setter inn Xylocain 10 mg./ml. m./adr. til slutt. Trådene på tampongene tapes opp på pas. nese, og klippes korte. Evt. to tuffere tapes under pasientens nese.

Kryssreferanser

Eksterne referanser