

## Polypevulsjon med shaver - Ø.N.H. SSA

Side 1 av 2

Dokument ID:

**II.SOK.ØNH.SSA.2.b-7**

Godkjent dato:

**26.10.2023**

Gyldig til:

**26.10.2025**

Revisjon:

**7.03**

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Nesepolypper fjernes med shaver.

Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse med sedasjon.

### **Rack med kamera (Storz) plasseres ved hodeenden Shaverapparatet settes frem.**

#### **UTSTYR:**

Utstyr fra Sterilsentralen: Shaver

Fessinstrument-container

Utstyr fra lager: Nesesett

Utstyr fra st.13:

Sett til innleggelse nesetamponger

Ev bomullspinner

1 Mini-Spike

2 gastamponger (sterile)

1 kameratrekk

( Ev 1 kameratrekk til Shaveren hvis ikke sterilisert)

1 Rett sug, engangs

1 Bøyd sug, engangs

3 Boller

Utstyr fra lager utenfor st. 13:

Slangesett til Shaver

Shaverkniv

Mellomstykke til kamera

2-delt mellomstykke (Steinsvåg) ( Rengjøres med 3-trinns system Tristel )

stiv optikk 0 grader, tykk

stiv optikk 30 grader, tykk (Tilgjengelig)

grå lysledning

evt. 2 stk. meroceltamponger, lange eller korte (spør legen)

Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor st.13:

1 hetteglass Tetracain m./adr.

1 tube Terra-cortril salve

1 hetteglass med Xylocain 10 mg./ml.m./adr.

1 flaske NaCl

1 POSE NACL

#### **LEIE:**

”strandstol”/ sittende

Utarbeidet av: <b>Angela Wallin Larsen</b>	Fagansvarlig: <b>Anders Torp</b>	Godkjent av: <b>Marte J. Hosøy Novik</b>	Dokumentnr.: D38806
-----------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------

		<b>Polypevulsjon med shaver - Ø.N.H. SSA</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-7	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Anders Torp	Godkjent dato: 26.10.2023	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 7.03

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

**PRE-OPR.FORBEREDELSE – LOKALBEDØVELSE:**

Hvis bomullspinner: fuktes i tetracain m. adr. og settes inn i pas. nese av legen.

Pasienten en gastampong, fuktet med tetracain m./adr. i hvert nesebor.

Evt. injiseres Xylocain 10 mg./ml. m./adr.

**HUDESINFEKSJON:**

ingen vask

**DEKKING:**

Selvheftende laken med lim festes under pasientens hake.

I tillegg ved narkose: Øyeplaster (Operatør skal kunne se øynene på pas.) Håndkle med lim festes fra overkant av nesen og oppover.

**OPERASJONSFREMANGSMÅTE:**

Opr. gjøres gjennom nesen. Operatøren fører shaveren inn i nesen, og shaveren ”klipper” og suger ut polypper. Er det veldig trange forhold så plukkes polyppene ut med en weils tang.

**Kryssreferanser**

**Eksterne referanser**