

		Klinikknivå			Retningslinje
Perifer venekanyle (PVK) - rekvisisjon - SSK					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOK.AIO.SSK.2.c-28		Godkjent dato: 28.03.2023	Revideres innen: 28.03.2025	Sist endret: 28.03.2023	Revisjon: 2.04

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Sikre god oppfølging av pasienter som trenger assistanse fra anestesipersonell for å få lagt perifer venekanyle (PVK).

MÅLGRUPPE

Sykepleiere på sengepost med pasientansvar og anestesipersonell som skal legge PVK.

FREM GANGSMÅTE

- Ring Aksess-team/ anestesisykepleier på telefon 3700 og gi beskjed om at det trengs assistanse fra anesthesiavdelingen for å få anlagt PVK
- Avtal når pasienten kan komme til operasjon ventehall. Eventuelt ved behov, at anestesipersonellet må komme til pasientens avdeling
- Fyll ut PVK rekvisisjonen og la denne følge pasienten/ligge i pasientkurve
- Når PVK er anlagt har bestillende avdeling ansvar for å makulere PVK rekvisisjonen ved utreise
- Mellom kl. 11.00-13.00 og 22.30-08.00, legges PVK på grunn av bemanning kun ved sterk indikasjon

Kryssreferanser

[II.SOK.AIO.SSK.2d-17](#) [Rekvisisjonskjema - PVK \(til utskrift\) SSK](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Stine Smith, Sindre Ose, Espen Lauritsen	Fagansvarlig: <input type="checkbox"/>	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Dok.nr: D44083
--	---	--	---	--------------------------