

Sjekkliste aktivering av traumeteam SSHF

Skjema for mottak av melding om mulig traumeteam. [Se prosedyre for tilleggsopplysninger.](#)

Melding:

Annet/kommentar:

PASIENT ID
(etikett)

Ansvarshavende sykepleier akuttmottak har ansvar for traumeaktivering.

Konferert: Ja Nei

Hvis ja: Kirurg Ortoped Andre


Dato:

Melding mottatt kl.:

Alarm utløst kl.:

Vitale funksjoner


- Respirasjonsfrekvens <10 eller >29/min, eller behov for ventilasjonsstøtte (<20 for barn < 1 år)
- Oksygenmetning (SpO2) <90 % uten O2
- Vedvarende systolisk BT ≤90 mmHg (≤ 110 mmHg > 65 år)
- Hjerterefrekvens > systolisk BT hos voksne
- GCS <14
- Alvorlig nedkjøling uten normal sirkulasjon



Utløse
traumealarm

Anatomisk skadeomfang

- Truet luftvei/fare for truet luftvei
- Skallebrudd/impresjonsfraktur
- Penetrerende skade på ansikt, hals, torso og ekstremiteter proksimalt for albu eller kne
- Mistanke om multiple costafrakturet)
- Store ytre blødninger
- Stor knusningsskade
- Mistenkt brudd i to eller flere store rørknokler
- Mistanke om bekkenbrudd
- Mistanke om ryggmargsskade (nevrologiske utfall)
- Mistanke som alvorlig skade i to kroppsavsnitt (hode/hals/thorax/abdomen/bekken/rygg/femur)
- 2. eller 3.grads forbrenning >15 % av kroppsoverflate (barn >10 % (barn er personer <18 år)) eller inhalasjonsskade




Utløse
traumealarm

Skademekanisme

Vurder energien pasienten har vært utsatt for
Bilskade eller utforkjøring:

- > 50 km/t uten bilbelte eller ikke utløst airbag
- Kjøretøyet har rullet rundt
- Fastklemt person i kjøretøy
- Kastet ut av kjøretøyet
- Syklist eller fotgjenger påkjørt av motorkjøretøy
- Fall fra høyde > 3 m, lavere terskel hos barn og >65 år



Utløse
traumealarm

HVIS:

- Alder > 65 år
- Alder < 5 år
- Alvorlig grunn sykdom
- Gravid pasient > uke 20
- Økt blødningsfare (antikoagulasjon)
- Ruspåvirkning

Lavere terskel for utløsning av traumealarm