

		Generelle fagprosedyrer		Kliniske fagprosedyrer	
Veiledning til blanding av Cloxacillin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.				Side 1 av 1	
Dokument ID: I.3.12-6		Godkjent dato: 02.10.2024	Gyldig til: 02.10.2026	Revisjon: 4.02	

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Intermitterende infusjon

Materialet du skal bruke:

- 1 stk. 500 ml 0,9 % NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.
(2 stk 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Cloxacillin, antall hetteglass svarende til ordinert døgndose.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter 20ml (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen og 1 tilsetningslapp

Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (Trek ut ca. 16 ml av 500 ml NaCl fra infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta opptil flere minutter.
4. Gjenta punkt 1 før en trekker opp og tilfører cloxacillin-oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig. Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 520 ml

[I.3.12-10](#)

[Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#)

Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Marianne Jacobsen	Godkjent av: Per Engstrand	
--	---	--------------------------------------	--