

B05X A01	<h2 style="text-align: center;">KALIUMKLORID KCl</h2> <h3 style="text-align: center;">Kaliumklorid B. Braun®</h3>				Blandekort for voksne
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
1 mmol/ml inf.konsentrat, ampulle og hetteglass		<p>Må fortynnes før bruk^{1,2}</p> <p><u>Fortynningsvæske</u>^{2,3} Glukose 50 mg/ml*, NaCl 9 mg/ml eller Ringer-acetat</p> <p><u>IV infusjon, perifer vene</u>^{1,2,3,5} Anbefalt maksimal konsentrasjon 40 mmol/liter</p> <p><u>IV infusjon, sentral vene</u>^{1,2,3} Opptil 80 mmol/liter ved alvorlige hypokalemier (kalium < 2,5 mmol/l)..</p>	<p>Hastigheten bør styres med en infusjonspumpe etter legens ordinerings¹.</p> <p><u>IV infusjon</u>^{1,2,3} Over 4-6 timer.</p> <p><u>Anbefalt makshastighet</u>^{1,2,3,5} 10 mmol/time uten EKG overvåkning</p> <p>20 mmol/time med EKG overvåkning i <u>perifer vene</u>.</p> <p>40 mmol/time med EKG overvåkning i <u>sentral vene</u>.</p>	<p><u>Ampuller</u>^{1,4} Engangsbruk</p> <p><u>Anbrutt hetteglass</u>^{1,4} 24 timer i RT/ KJ</p> <p><u>Fortynnet løsnings</u>^{1,4} 24 timer i RT/KJ</p> <p><u>Kontinuerlig infusjon</u>^{1,4} 24 timer i RT</p>	<p><u>Forsiktighet</u>^{1,2,3} Ved redusert nyrefunksjon. Økt fare for hyperkalemi.</p> <p>Rask infusjon av høye konsentrasjoner kan gi overdosering med arytm, hjerteblokk og hjertestans^{1,5}.</p> <p>Ekstravasasjon kan gi vevsskade^{1,5}</p> <p>OBS! Tromboflebitt⁵</p>
Konsentrasjon: 1 mmol K ⁺ /ml		Blandes godt.			
<p>Tilleggsopplysninger:* Glukoseløsninger fremmer opptak av intracellulære ioner (kalium), og bør foretrekkes. NB! Ved initial behandling av alvorlig hypokalemi, brukes NaCl 9 mg/ml i stedet for glukose, for å unngå ytterligere fall av kalium i plasma³.</p> <p>Anbefalt dosering (infusjon)^{2,3}: S-kalium > 2,5 mmol/l: 40-60 mmol kaliumklorid i 1 liter infusjonsvæske gitt over 4-6 timer (10 mmol/time) i perifer vene.</p> <p>S-kalium < 2,5 mmol/l: 80 mmol kaliumklorid i 1 liter Ringer-acetat eller NaCl 9mg/ml gitt over 4-6 timer i sentral vene.</p> <p>Se også egne blandekort: Kaliumklorid - Intensiv</p>					
<p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC). Norsk legemiddelhåndbok, nettoutgave 2017. Elektrolyttveileder, Diakonhjemmet Sykehus, 2. utgave 2014, Kiarash Tazmini. Tilgjengelig via Helsebiblioteket. Statens legemiddelverk, Norske legemiddelstandarder, kapittel 6 Oppbevaringstider og veiledende brukstider for sterile legemidler etter anbrudd. Injectable medicines administration guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell. 					
Utarbeidet av Sykehusapoteket i Kristiansand			Revidert: 04.04.2022		