

A11 EB	<b>Vitamin B og vitamin C til parenteral bruk</b> <b>PABRINEX INTRAVENOUS HIGH POTENCY INJECTION®</b> <b>SYNDREX®</b>			<b>Blandekort</b> for voksne
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
<b>Ampulle 1</b> - 5 ml inneholder: <sup>1,2</sup> Tiamin (vitamin B1) 50 mg/ml Riboflavin (vitamin B2) 0,8 mg/ml Pyridoksin (vitamin B6) 10 mg/ml  <b>Ampulle 2</b> – 5 ml inneholder: <sup>1,2</sup> Askorbinsyre (vitamin C) 100 mg/ml Nikotinamid (vitamin B3) 32 mg/ml Glukose, anhydrert 200 mg/ml	Fortynningsvæske <sup>1,2</sup> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50mg/ml.  IV infusjon: <sup>1,2</sup> 10 ml (ampulle 1+2) tilsettes i 50 -100 ml infusjonsvæske	IV infusjon <sup>1,2,3</sup> Over 30 minutter.	Etter anbrudd <sup>1,2</sup> : 7 timer i RT/KJ	Hvis ikke c- vitamin ønskes, kan kun ampulle 1 gis pasienten. <sup>3</sup>
Forslag til dosering og administrasjon: <sup>1,2,3</sup> 10 ml (ampulle 1+2) tilsettes 50 -100 ml infusjonsvæske (NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml) og gis IV over 30 minutter.  Ved væskerestriksjon: <sup>4</sup> 10 ml (ampulle 1+2) kan gis som langsom IV injeksjon over 10 minutter.				
Referanseliste:  1. eMC: Pabrinex Intravenous High Potency Injection, www.medicines.org.uk/emc 2. Pakningsvedlegg Syndrex, JSC Farmak, godkjent 15.08.2023 3. <a href="#">L23.6.2.5 Vitamin B + vitamin C – parenterale, Legemiddelhandboka (legemiddelhandboka.no)</a> 4. <a href="#">eHåndbok - Pabrinex/Syndrex (vitamin B og C) - blandekort for legemidler til voksne, intensiv /overvåkning (ous-hf.no)</a>				
Utarbeidet av Sykehusapotekene Sørlandet			Dato: 04.10.24	