

		Somatikk Arendal		Retningslinje	
keratittprøvetaking				Side 1 av 2	
Dokument ID: II.SOA.ØYE.2.3.2-3		Godkjent dato: 14.06.2022	Gyldig til: 14.06.2024	Revisjon: 1.04	

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Fremre segment/Kornea

Keratittprøvetaking:

- Gi lokalbedøvelse
- Skyll vekk fluorecin med NaCl dersom dette er brukt.

- 1: Transwab (blå kork) taes fra nedre fornix. (merk prøve: sekret, nedre fornix)
- 2: Transwab (blå kork) taes fra infiltratet på kornea (merk prøve: avskrap, infiltrat kornea)
- 3: Cobas swab (Chlamydiapensel) ved mistanke

Fremgangsmåte:

Prøveikon i verktøylinja

Ny rekvisisjon

Velg mikrobiologisk dyrkning

Velg øye keratitt/endoftalmitt dyrkning

Fyll ut kliniske opplysninger

Fyll inn evt merknad fra rekvirent

Velg type materiale og lokalisasjon/posisjon for hvert agens.

Adenovirus: sekret

Herpes: tårevæske

Klamydia: sekret

Dyrkning: tårevæske + avskrap cornea

Velg lagre

Velg etiketter (hentes på femtosekundlaser rommet)

Settes på 2 transwab glass og evt ett cobas swab.

Glassene leveres opp på laboratoriet.

Utarbeidet av: linda hermansen	Fagansvarlig: erlend sødal	Godkjent av: Erlend Sødal	
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	keratittprøvetaking				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.3.2-3	Utarbeidet av: linda hermansen	Fagansvarlig: erlend sødal	Godkjent dato: 14.06.2022	Godkjent av: Erlend Sødal	Revisjon: 1.04

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Fremre segment/Kornea

Kryssreferanser

Eksterne referanser