

BROKK

 Dokument ID:
II.SOK.AIO.SSK.2.d-20

 Gruppe:
 □

 Godkjent dato:
24.11.2023

 Gyldig til:
24.11.2025

 Revisjon:
1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Ved lyskebrokk-operasjon er det vanlig at det kan oppstå hevelse og misfarging på penis og skrotum pga blødning, viktig å informere pasienten om dette. Obs blod- / væskeansamling. Bandasjen forsterkes ved gjennomsiv første 24 timer.
DIURESE	KAD fjernes peroperativt Blærescane pasienter som ikke klarer å late vannet spontant postoperativt, og om nødvendig engangskateterisere pasienten.
SMERTESTILLENDE	Smertestillende behandling til voksne postoperative pasienter Ved kikkhullsoperasjon blir det satt inn CO2 i magen under operasjonen, og det kan føre til at pasienten får midlertidige skuldersmerter. Ved lyskebrokk-operasjon kan lokalbedøvelsen i såret også affisere øverst på låret, noe som kan føre til problemer ved mobilisering rett etter operasjon.
DIVERSE	Svekkelse av bukveggen, som gir anledning for bukhinne og eventuelt ledsagende tarm og fettvev å komme ut gjennom denne åpningen, kaller man et brokk. Brokk deles inn i grupper etter hvor de opptrer: lyske, navle eller lår. Under operasjonen løsnes brokket og svakheten i bukveggen kan enten sys direkte, eller lukkes med et kunststoffnett som forsterkning. Inngrepet gjøres enten i lokal bedøvelse eller i narkose, som kikkhullskirurgi eller åpen operasjon.

Kryssreferanser

II.KIK.KSE.FEL.5-11

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 20.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	□
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---