

		<b>PASIENTER OG BRUKERE</b>		<b>Retningslinje</b>
<b>COLEKTOMI</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>II.SOK.AIO.SSK.2.d-22</b>	Gruppe: <input type="checkbox"/>	Godkjent dato: <b>19.08.2024</b>	Gyldig til: <b>19.08.2026</b>	Revisjon: <b>1.02</b>

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

## Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Forebyggende pep ventil/ CPAP til utsatte pasienter, hjelp til å støtte ved hoste.
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Obs blødning i bandasjen/rectalt. Etter operasjonen, pasientene er i faresonen for anastomotisk lekkasjer eller sammenbrudd hvor tarmen er koblet sammen. Hb/Hct/elektrolytt - kontroll etter 2-4 timer. Stort snitt, mye perspiratio peropr., gi væske i forhold til diurese/blødning. Disse pasientene har ofte nedsatt almentilstand på forhånd og er dermed spesielt utsatt for postoperative komplikasjoner.
STOMI	Ileostomi anvendes hvis tykktarmen fjernes, og enden av tynntarmen legges ut nede på høyre side av magen. Observer stoma og hudområdet rundt i forhold til utseende; farge, hevelse, sårhet, allergi og lekkasje.
DIURESE	Folekateter
SMERTESTILLENDE	Smertestillende behandling av voksne postoperative pasienter Dette er et smertefullt inngrep, start epidural etter ordinasjon. Se egen prosedyre.
KOST	
DIVERSE	En total coлектomi, er når hele tykktarmen fjernes. Gjøres per laprotomi, se egen prosedyre.

### Kryssreferanser

### Eksterne referanser

Utarbeidet av: <b>C. H. Fjukstad</b>	Først utgitt: <b>15.06.2020</b>	Fagansvarlig: <b>J. Hauss, O. G. Vinorum</b>	Godkjent av: <b>Avd.leder Grete K. Erdvik</b>	<input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	---	--	--------------------------