

TVP- TRANSVESICAL PROSTATEKTOMI

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.d-33

Gruppe:

□

Godkjent dato:

29.07.2024

Gyldig til:

29.07.2026

Revisjon:

1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Obs. evt bradycardi/blodtrykksfall når spinalanestesi går ut. Atropin/Efedrin i akuttskrin. Det blir lagt inn et sårdrain. Observér mengde og at det er vakuum.
DIURESE	Blæren blir sydd og pasienten får et avlastende kateter i 5 dager. Pasientene får blærekateter med gjennomskyll av saltvann i blæren til blødningen avtar. Blæreskylling Det innvendige såret i prostata fører ofte til svie, hyppig vannlating og blod i urinen. Blør det mye eller vannlatingen stopper; kontakt urolog
SMERTESTILLENDE	Smertestillende behandling av voksne postoperative pasienter Pasientene får ofte EDA smertepumpe Epidural smertelindring
DIVERSE	Fjerning av blærehalskjertelen – Transvesikal prostatektomi (TVP) Når prostata er større enn 70-80 gram blir det utført laparotomi

Kryssreferanser

Fjerning av blærehalskjertel ved åpen operasjon - Transvesikal prostatektomi - Pasientinformasjon SSHF
Prostatektomi transvesikal (TVP)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 20.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	□
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---