

## Stell av nyoperert PD-kateter - SSHF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

I.4.4.2-8

Godkjent dato:

31.05.2023

Revideres innen:

31.05.2025

Sist endret:

28.11.2023

Revisjon:

1.07

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

**HENSIKT**

Forebygge infeksjon i PD-kateterutgangen.

Sørge for god immobilisering av PD-kateteret.

**OMFANG**

Utføres av sykepleier før oppstart PD.

De første tre til fire ukene skal bandasjen på PD-kateterutgangen skiftes en gang i uken hvis det er tørr bandasje og ikke tegn til infeksjon.

PD-kateterutgang og midtlinjesnitt bandasjeres hver for seg. Stell PD-kateterutgangen først.

**Utstyr**

- Vaskesett eller (on-off sett HD)
- Tegaderm 10 x 25 cm 2 -3 stk eller tilsvarende
- Klorhexidin sprit 5mg/ml
- Sterile hansker
- Munnbind
- Mepore 6 x 7 cm eller tilsvarende
- Sterile kompresser 3 pk.

**HANDLING**

Rengjør arbeidsbordet

Ta på munnbind

Vask hendene

Dekk opp sterilt

Ta av gammel bandasje og inspisere PD-kateterutgangen:

- Hudfarge
- Sekresjon
- Hevelse
- Ømhet / smerte

Desinfiser hendene og ta på sterile hansker.

Vask rundt kateterutgangen med klorhexidin fuktet tupfer/kompresser OBS ! Alltid innenfra og utover.

Legg kompresser 10 x 10 cm over og under kateteret.

- Midtlinjesnittet vaskes eventuelt med klorhexidinfuktet tubfer/kompress (eventuelle strips fjernes etter to uker). Legg på Mepore 6 x 7 cm eller tilsvarende.

Legg på Tegaderm eller tilsvarende som skal dekke godt over både PD-kateterutgang, kateter og operasjonssnitt.

Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Verifisert av: □	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D44989
--	---	---------------------	-------------------------------	-------------------

Dokument-id: I.4.4.2-8	Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Godkjent dato: 31.05.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.07
---------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

Ved mistanke om infeksjon (siv/sekresjon i bandasje) skal det tas bact.us prøve.

Pasienten bør vente minst 1 – 2 uker med å dusje.

Alltid bandasjeskift etter dusj.

### Kryssreferanser

### Eksterne referanser