

Opptrekk intravitreale injeksjoner

Side 1 av 2

Dokument ID:
II.SOA.ØYE.2.8.2-10Godkjent dato:
12.06.2023Gyldig til:
12.06.2025Revisjon:
3.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk

Formål

Klargjøring av sprøyter til intravitreale injeksjoner etter sterile prinsipper

Forberedelser

Det skal være 2 sykepleiere som gjør opptrekk sammen.

Hele opptrekkprosedyren skal foregå i området med rensset luft fra LAF maskinen.

Utstyr

- Sterile hansker
- Steril duk til oppdekking
- Sterile sprøyter 1 ml
- Eylea/Lucentis/Avastin
- Steriswab

Fremgangsmåte

- Desinfiser overflater
- Legg ut steril duk
- Legg på antall behandlingssprøyter, pluss en sprøyte til opptrekk og opptrekkskanyle fra medisinfopkningen
- Desinfiser toppen av hetteglassene
- En sykepleier tar på sterile hansker og en sykepleier holder i hetteglassene under opptrekk fra disse
- Den «usterile» sykepleieren tar på sterile hansker under opptrekk fra 1 ml- sprøyte til behandlingssprøytene
- Det trekkes opp 0,05 ml Eylea/Lucentis/Avastin i hver behandlingssprøyte
- Sprøytene pakkes inn sterilt og oppbevares sterilt frem til bruk

Dokument-id:
II.SOA.ØYE.2.8.2-10Utarbeidet av:
Ann Karin BjurstrømFagansvarlig:
Espen RingvoldGodkjent
dato:
12.06.2023Godkjent av:
Espen RingvoldRevisjon:
3.00